



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 02 - 2020.

REGION SANITARIA	PFA			EFE			DIFTERIA			COQUELUCHÉ			PAROTIDITIS			TNN			TOE			VARICELA			ESAVI					
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	C. Fin			
Concepción	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
S. Pedro N.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	...	1	0
S. Pedro S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cordillera	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Guairá	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caaguazú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caazapá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Itapúa	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0
Misiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paraguarí	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
A. Paraná	0	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	5	0	5	0
Central	1	9	0	0	0	1	0	0	4	0	4	0	0	0	9	0	9	0
Ñeembucú	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amambay	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Canindeyú	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Pdte. Hayes	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
Boquerón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Paraguay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asunción	0	4	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	1	0	1
Total País	1	0	0	25	0	0	0	0	0	2	0	0	8	0	8	0	0	0	0	27	0	27	2	0	2			

Notif: Casos sospechosos notificados desde la SE 02- 2020.

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI de la SE 2 del 2020, notificados por las regiones sanitarias.

En la semana 02 el **país no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, poliomiélitis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: en la semana 02 se han notificado 25 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales aun ninguno ha sido descartado para estas dos enfermedades, por haberse tomado las muestras de forma temprana y por lo cual se ha solicitado segunda muestra de los mismos para sus respectivos descartes y clasificación final.

Vigilancia de las Parálisis Fláccida Aguda en < de 15 años (PFA) para poliomiélitis: En la SE 02 contamos con la notificación de 1 caso de PFA correspondiente a la XI RS la misma cuenta con muestra ya en el laboratorio.

Coqueluche: Se ha notificado 2 casos sospechosos correspondiente a la XI RS y XIIIRS respectivamente las cuales aun se encuentra pendiente su clasificación por no contar con resultado laboratorial.

Parotiditis: En la semana 02 se han notificado 8 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Tétanos en otras edades (TOE): Hasta la fecha sin caso reportado

Varicela: En la semana 02 se han notificado 27 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): En la semana 02 se han reportado dos casos, correspondiente a la I y XVIII R.S.

Se pide a las regiones sanitarias: - Verificar las fichas ha ser enviadas, pues la mayoría están incompletas.

- Adjuntar el carnet de vacunación.
- Realizar el seguimiento de los casos graves y enviar la historia clínica y /o la epicrisis.

Atención: Las regiones que han presentado casos de parotiditis y varicela, deben realizar el seguimiento a los contactos a fin de cortar con la cadena de trasmisión, así como también poder identificar oportunamente brotes en la comunidad.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2019 – 2020 SE 02

Tasa ideal de EFE a la SE 02 = 0,2

Tasa ideal de PFA a la SE 02 = 0,03

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA												POLIOMIELITIS							
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		% Muest llog. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa **	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Concepción	90	97	100	0	100	100	100	0	100	0	...	0,80	90	94
S. Pedro N	94	71	0,00	94	94
S. Pedro S	91	84	0,44	0,00	91	97
Cordillera	100	100	50	100	100	100	100	100	100	100	2,31	0,33	100	98
Guairá	94	86	...	100	...	100	...	100	...	100	0,45	0,44	94	97
Caaguazú	100	91	0,00	100	94
Caazapá	99	97	0,00	99	99
Itapúa	97	98	33	0	100	100	100	...	100	100	0,17	0,12	97	98
Misiones	89	99	0,00	89	99
Paraguarí	100	98	86	0	100	100	86	75	86	75	...	1,55	100	99
A. Paraná	83	83	...	0	...	100	...	100	...	100	...	0,12	83	90
Central	100	100	36	33	91	100	90	67	75	67	0,28	0,42	100	100	...	100	...	100	...	0,17
Ñeembucú	100	100	...	50	...	100	...	0	...	0	1,12	2,23	100	99
Amambay	100	100	1,20	0,00	100	100
Canindeyú	81	79	100	...	100	...	0	...	100	...	0,44	0,00	81	96
Pdte. Hayes	97	100	50	...	100	...	100	...	50	...	2,43	0,00	97	99
Boquerón	100	94	0,00	100	97
A. Paraguay	100	100	0,00	100	97
Asunción	99	99	100	50	80	100	100	50	100	...	0,76	0,77	99	99
Total País	95	93	57	32	93	100	90	56	83	56	0,38	0,35	97	97	...	100	...	100	...	0,05

* Tasa mínima esperada de EFE - 5:100.000 habitantes.

** Tasa mínima esperada de PAF - 1:100.000 < 15 años.

... No corresponde por ausencia de notificación de casos

Último caso registrado de Sarampión en 1998, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomieltis en 1985.

Pobl. Gral: 7.152.703 – Pobl. < 15 años: 2.091.813

En la tabla N° 2. Se presentan los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomieltis**; recordando que el mínimo requerido es de 80% por indicador, pero nuestro país se ha propuesto alcanzar el 95% en cada región sanitaria por el riesgo de reintroducción del sarampión/ rubéola.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Actualmente el país cuenta con 1259 Unidades Notificadoras. En la SE 2 se ha alcanzado un porcentaje de 93 % en este indicador.

Se recuerda a las regiones realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos reportados en la planilla de ENO con el número de casos notificados por notificación individual por ficha epidemiológica.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: La tasa de notificación ideal a la SE 02 debe ser de **0,2** casos de EFE por 100.000 Hts; de las cuatro regiones que han notificado casos solo la XIRS no ha alcanzado la tasa esperada para esta semana. Pero la capacidad de respuesta del país dentro de las 48hs a nivel de los servicios de salud, no se ha cumplido. Tabla 2.

La capacidad de respuesta de las regiones dentro de las 48 Hs, es de suma importancia para controlar un posible brote de sarampión o rubéola, evitando la dispersión en la comunidad y que se restablezca en el país.

Indicadores de Vigilancia de la Poliomieltis: A la semana 2 se ha reportado 1 caso de PFA el cual cuenta con el 100% en los indicadores de investigación y muestra adecuada. Tabla 2

OBS: Es importante que cada región realice el análisis de sus indicadores, a fin de