



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 06 - 2020.

REGION SANITARIA	PFA			EFE			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS			TNN			TOE			VARICELA			ESAVI		
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	C. Fin
Concepción	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	...	3	1	0	1
S. Pedro N.	0	0	0	0	0	0	0	1	...	1	0
S. Pedro S.	0	2	1	0	0	0	0	0	0	5	...	5	0
Cordillera	0	32	8	0	0	0	2	0	2	0	0	5	0	5	0
Guairá	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Caaguazú	0	11	2	0	0	1	1	...	1	0	1	0	0	1	...	1	0
Caazapá	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Itapúa	0	2	2	0	0	0	0	0	0	15	0	15	0
Misiones	0	0	0	1	1	...	0	0	0	1	...	1	0
Paraguarí	0	44	11	0	0	0	5	0	5	0	0	15	0	15	0
A. Paraná	0	2	1	0	0	0	5	0	5	0	0	8	0	8	0
Central	1	52	23	0	0	1	...	0	14	0	14	0	0	26	0	26	1
Ñeembucú	0	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Amambay	0	8	0	1	1	0	2	0	2	0	0	1	...	1	0
Canindeyú	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Pdte. Hayes	0	5	1	0	0	1	0	1	0	0	0	4	0	4	0
Boquerón	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
A. Paraguay	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asunción	0	15	7	0	1	1	6	0	6	0	0	20	0	20	1	0	1
Total País	1	0	0	187	66	0	1	0	0	7	4	1	35	0	35	0	0	0	0	106	0	106	3	0	2

Notif: Casos sospechosos notificados desde la SE 06- 2020.

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI de la SE 1 a la 6 del 2020, notificados por las regiones sanitarias.

Desde la SE 1 a la SE 6 el **país no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, poliomieltis, difteria, tétanos en otras edades y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: desde la SE 1 a la SE 6 se han notificado 187 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 66 han sido descartado para estas dos enfermedades.

Vigilancia de las Parálisis Fláccida Aguda en < de 15 años (PFA) para poliomieltis: desde la SE 1 a la SE 6 se ha notificado 1 caso sospechoso de PFA correspondiente a la XI RS.

Coqueluche: se ha confirmado el primer caso de coqueluche del año; corresponde a un lactante de 1 mes de vida, con residencia en el Dpto. de Pdte. Hayes. Se encuentra hospitalizado en la UTI del Hospital Gral. Pediátrico. Desde la SE 1 a la SE 6 se han notificado 7 casos sospechosos de las cuales 4 fueron descartados y dos queda pendiente de clasificación.

Parotiditis: desde la SE 1 a la SE 6 se han notificado 35 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Tétanos en otras edades (TOE): Hasta la fecha sin caso reportado.

Varicela: desde la SE 1 a la SE 6 se han notificado 106 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): desde la SE 1 a la SE 6 se han reportado 6 casos, correspondiente a la I, XI y XVIII R.S.

Atención: Las regiones que no han notificados casos de EFE hasta la SE 6 (II N, VI, VIII, XIV, XVI y XVII), deben realizar un control cruzado con la vigilancia de arbovirosis; ya que hemos identificado que han notificado casos con exantema que no ingresaron a la vigilancia de sarampión/rubéola, principalmente aquellos casos que no tienen aún clasificación final de dengue u otra arbovirosis.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2019 – 2020 SE 06

Tasa ideal de EFE a la SE 06 = 0,58

Tasa ideal de PFA a la SE 06 = 0,11

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA											POLIOMIELITIS								
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		%Muest llog. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa **		
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Concepción	92	98	100	100	100	100	100	100	100	100	1,66	1,19	92	98	0,00	...
S. Pedro N	90	74	0	...	100	...	100	...	100	...	0,50	0,00	90	74	0,00	...
S. Pedro S	90	84	...	100	...	100	...	0	...	50	0,00	0,88	90	84	0,00	...
Cordillera	100	99	100	97	100	94	67	79	44	79	2,98	10,41	100	99	0,00	...
Guairá	96	89	100	100	100	100	100	100	100	100	0,90	0,89	96	89	0,00	...
Caaguazú	86	89	100	9	0	91	0	20	0	20	0,18	1,97	86	89	100	...	100	...	0,58	...
Caazapá	99	76	100	...	100	...	67	...	100	...	1,60	0,00	99	76	0,00	...
Itapúa	97	83	78	100	89	100	78	100	67	100	1,50	0,33	97	83	0,00	...
Misiones	93	100	0,00	0,00	93	100	0,00	...
Paraguarí	100	100	86	30	93	57	100	76	69	76	5,46	17,08	100	100	0,00	...
A. Paraná	88	83	71	50	100	50	57	100	86	100	0,87	0,24	88	83	0,00	...
Central	99	100	50	44	89	87	85	62	75	69	3,59	2,41	99	100	...	100	...	100	0,00	0,17
Ñeembucú	100	100	...	100	...	100	...	86	...	100	0,00	10,02	100	100	0,00	...
Amambay	100	100	100	100	100	100	100	38	100	38	1,20	4,72	100	100	0,00	...
Canindeyú	87	81	67	...	100	...	33	...	33	...	1,33	0,00	87	81	0,00	...
Pdte. Hayes	94	100	100	40	100	40	80	50	60	50	4,05	3,98	94	100	0,00	...
Boquerón	100	94	100	...	100	...	100	...	0	...	1,56	0,00	100	94	0,00	...
A. Paraguay	100	100	0	...	100	...	100	...	0	...	5,70	0,00	100	100	0,00	...
Asunción	99	97	100	80	95	80	95	75	68	83	3,82	2,87	99	97	0,00	...
Total País	95	91	71	58	92	81	84	67	71	70	2,24	2,61	95	91	100	100	100	100	0,05	0,05

* Tasa mínima esperada de EFE - 5:100.000 habitantes.

** Tasa mínima esperada de PAF - 1:100.000 < 15 años.

... No corresponde por ausencia de notificación de casos

Último caso registrado de Sarampión en 1998, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomielitis en 1985.

Pobl. Gral: 7.152.703 – Pobl. < 15 años: 2.091.813

En la tabla N° 2. Se presentan los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomielitis**; recordando que el mínimo requerido es de 80% por indicador, pero nuestro país se ha propuesto alcanzar el 95% en cada región sanitaria por el riesgo de reintroducción del sarampión/ rubéola.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Actualmente el país cuenta con 1.288 unidades notificadoras. De la SE 1 a la 6 se ha alcanzado un porcentaje acumulado de 91 % en este indicador.

Se recuerda a las regiones realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos reportados en la planilla de ENO con el número de casos notificados por notificación individual por ficha epidemiológica.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: La tasa de notificación ideal a la SE 6 debe ser de **0,58** casos de EFE por 100.000 Hts; 11 regiones han alcanzado la tasa esperada para esta semana. Pero la capacidad de respuesta del país dentro de las 48hs a nivel de los servicios de salud, no se ha cumplido. Tabla 2.

La capacidad de respuesta de las regiones dentro de las 48 Hs, es de suma importancia para controlar un posible brote de sarampión o rubéola, evitando la dispersión en la comunidad y que se restablezca en el país.

Indicadores de Vigilancia de la Poliomielitis: desde la SE 1 a la SE 6 se ha reportado 1 caso de PFA que cuenta con el 100% en los indicadores de investigación y muestra adecuada. Tabla 2

OBS: Es importante que cada región realice el análisis de sus indicadores, a fin de verificar y comparar la calidad de sus datos; e identificar a tiempo los problemas que dificultan el cumplimiento de los mismos; y realizar intervenciones oportunas que eviten la reintroducción de enfermedades y/o la propagación de las mismas.