

Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 07 - 2020.

REGION SANITARIA	PFA			EFE			DIFTERIA			COQUELUCHÉ			PAROTIDITIS			TNN			TOE			VARICELA			ESAVI		
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	C. Fin
Concepción	0	5	3	0	0	0	1	0	1	0	0	4	...	4	1	0	1
S. Pedro N.	0	0	0	0	0	0	0	1	...	1	0
S. Pedro S.	0	5	1	0	0	0	0	0	0	6	...	6	0
Cordillera	0	38	8	0	0	0	2	0	2	0	0	6	0	6	0
Guairá	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Caaguazú	0	12	2	0	0	1	1	...	1	0	1	0	0	1	...	1	1
Caazapá	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Itapúa	0	2	2	0	0	0	0	0	0	15	0	15	2
Misiones	0	0	0	1	1	...	0	0	0	2	0	2	0
Paraguarí	0	49	12	0	0	0	5	0	5	0	0	16	0	16	1
A. Paraná	0	2	1	0	0	0	5	0	5	0	0	9	0	9	0
Central	2	58	23	0	0	2	...	0	17	0	17	0	0	34	0	34	5
Ñeembucú	0	9	5	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Amambay	0	10	0	1	1	0	2	0	2	0	0	1	0	1	0
Canindeyú	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Pdte. Hayes	0	5	1	0	0	1	0	1	0	0	0	5	0	5	0
Boquerón	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	3	0	3	0
A. Paraguayo	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Asunción	0	17	7	0	1	1	8	0	8	0	0	26	0	26	3	0	1
Total País	2	0	0	216	67	0	1	0	0	8	4	1	42	0	42	0	0	0	0	131	0	131	13	0	2

Notif: Casos sospechosos notificados desde la SE 07- 2020.

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI de la SE 1 a la 7 del 2020, notificados por las regiones sanitarias.

Desde la SE 1 a la SE 7 el **país no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, poliomielitis, difteria, tétanos en otras edades y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: desde la SE 1 a la SE 7 se han notificado 216 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 67 han sido descartado para estas dos enfermedades.

Vigilancia de las Parálisis Fláccida Aguda en < de 15 años (PFA) para poliomielitis: desde la SE 1 a la SE 7 se han notificado 2 caso de PFA correspondiente a la XI RS.

Coqueluche: Desde la SE 1 a la SE 7 se han notificado 8 casos sospechosos de las cuales 4 fueron descartados, 1 caso confirmado y 3 quedan pendiente su clasificación.

Parotiditis: desde la SE 1 a la SE 7 se han notificado 42 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Tétanos en otras edades (TOE): Hasta la fecha sin caso reportado.

Varicela: desde la SE 1 a la SE 7 se han notificado 131 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): desde la SE 1 la SE 7 se han reportado 13 casos de ESAVI

Atención: Las regiones que no han notificados casos de EFE hasta la SE 7 (**II N, VI, VIII y XVI**), deben realizar un control cruzado con la vigilancia de arbovirosis; ya que hemos identificado que han notificado casos con exantema que no ingresaron a la vigilancia de sarampión/rubéola, principalmente aquellos casos que no tienen aún clasificación final de dengue u otra arbovirosis.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2019 – 2020 SE 07

Tasa ideal de EFE a la SE 07 = 0,66

Tasa ideal de PFA a la SE 07 = 0,13

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA												POLIOMIELITIS								
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		%Muest llog. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa **		
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
Concepción	92	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,08	1,99	92	98	0,00	0,00
S. Pedro N	90	74	0	...	100	...	100	...	100	...	1,00	0,00	90	74	100	...	100	...	1,52	0,00	
S. Pedro S	90	84	...	60	...	40	...	0	...	50	0,44	2,19	90	84	0,00	0,00	
Cordillera	100	99	100	97	100	97	90	95	70	95	3,30	12,37	100	99	0,00	0,00	
Guairá	96	89	100	100	100	100	100	100	100	100	0,90	0,89	96	89	0,00	0,00	
Caaguazú	86	89	100	8	0	92	0	18	0	18	0,18	2,15	86	89	100	...	100	...	0,58	0,00	
Caazapá	99	76	50	...	100	...	83	...	100	...	3,21	0,00	99	76	0,00	0,00	
Itapúa	97	83	73	100	91	100	91	100	73	100	1,83	0,33	97	83	0,00	0,00	
Misiones	93	100	0,00	0,00	93	100	0,00	0,00	
Paraguarí	100	100	87	55	100	82	100	80	73	80	5,85	19,02	100	100	0,00	0,00	
A. Paraná	88	83	75	50	88	100	71	100	100	100	0,99	0,24	88	83	0,00	0,00	
Central	99	100	51	53	89	84	84	69	75	76	3,97	2,69	99	100	...	100	...	100	0,00	0,34	
Ñeembucú	100	100	...	100	...	100	...	89	...	89	0,00	10,02	100	100	0,00	0,00	
Amambay	100	100	100	100	80	100	75	70	75	70	5,99	5,90	100	100	0,00	0,00	
Canindeyú	87	81	50	100	100	100	50	100	50	100	1,77	0,43	87	81	0,00	0,00	
Pdte. Hayes	94	100	100	40	100	40	100	50	60	50	4,05	3,98	94	100	0,00	0,00	
Boquerón	100	94	100	...	100	...	100	...	0	...	1,56	0,00	100	94	0,00	0,00	
A. Paraguay	100	100	0	0	100	100	100	100	0	100	5,70	5,59	100	100	0,00	0,00	
Asunción	99	97	96	82	91	76	90	77	67	85	4,40	3,25	99	97	0,00	0,00	
Total País	95	91	69	67	92	86	86	76	74	79	2,68	3,02	95	91	100	100	100	100	0,10	0,10	

* Tasa mínima esperada de EFE - 5:100.000 habitantes.

** Tasa mínima esperada de PAF - 1:100.000 < 15 años.

... No corresponde por ausencia de notificación de casos

Último caso registrado de Sarampión en 1998, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomielitis en 1985.

Pobl. Gral: 7.152.703 – Pobl. < 15 años: 2.091.813

En la tabla N° 2. Se presentan los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomielitis**; recordando que el mínimo requerido es de 80% por indicador, pero nuestro país se ha propuesto alcanzar el 95% en cada región sanitaria por el riesgo de reintroducción del sarampión/ rubéola.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Actualmente el país cuenta con 1.288 unidades notificadoras. De la SE 1 a la 7 se ha alcanzado un porcentaje acumulado de 91 % en este indicador.

Se recuerda a las regiones realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos reportados en la planilla de ENO con el número de casos notificados por notificación individual por ficha epidemiológica.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: La tasa de notificación ideal a la SE 7 debe ser de **0,66** casos de EFE por 100.000 Hts; 12 regiones han alcanzado la tasa esperada para esta semana. Pero la capacidad de respuesta del país dentro de las 48 hs a nivel de los servicios de salud, no se ha cumplido. Tabla 2.

La capacidad de respuesta de las regiones dentro de las 48 Hs, es de suma importancia para controlar un posible brote de sarampión o rubéola, evitando la dispersión en la comunidad y que se restablezca en el país.

Indicadores de Vigilancia de la Poliomielitis: desde la SE 1 a la SE 7 se ha reportado 2 casos de PFA que cuenta con el 100% en los indicadores de investigación y muestra adecuada. Tabla 2

OBS: Es importante que cada región realice el análisis de sus indicadores, a fin de verificar y comparar la calidad de sus datos; e identificar a tiempo los problemas que dificultan el cumplimiento de los mismos; y realizar intervenciones oportunas que eviten la reintroducción de enfermedades y/o la propagación de las mismas.