



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 08 - 2020.

REGION SANITARIA	PFA			EFE			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS			TNN			TOE			VARICELA			ESAVI		
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	C. Fin
Concepción	0	5	3	0	0	0	1	0	1	0	0	4	...	4	1	0	1
S. Pedro N.	0	1	0	0	0	0	0	1	...	1	0
S. Pedro S.	0	6	1	0	0	0	0	0	0	12	...	12	1
Cordillera	0	44	22	0	0	0	2	0	2	0	0	6	0	6	0
Guairá	0	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Caaguazú	0	31	14	0	0	1	1	...	1	0	1	0	0	1	...	1	1
Caazapá	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Itapúa	0	2	2	0	0	0	0	0	0	18	0	18	2
Misiones	0	0	0	1	1	...	0	0	0	2	0	2	0
Paraguarí	0	54	22	0	0	0	5	0	5	0	0	16	0	16	1
A. Paraná	0	2	1	0	0	0	5	0	5	0	0	9	0	9	0
Central	2	64	32	0	0	4	...	0	19	0	19	0	0	38	0	38	5
Ñeembucú	0	11	9	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0
Amambay	0	14	5	0	0	1	1	0	2	0	2	0	0	3	0	3	0
Canindeyú	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Pdte. Hayes	0	7	1	0	0	1	0	1	0	0	0	5	0	5	0
Boquerón	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	3	0	3	0
A. Paraguayo	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Asunción	0	21	10	0	1	1	8	0	8	0	0	29	0	29	3	0	1
Total País	2	0	0	266	125	0	1	0	0	10	4	1	46	0	46	0	0	0	0	149	0	149	14	0	2

Notif: Casos sospechosos notificados desde la SE 08- 2020.

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI de la SE 1 a la 8 del 2020, notificados por las regiones sanitarias.

Desde la SE 1 a la SE 8 el **país no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, poliomielitis, difteria, tétanos en otras edades y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: desde la SE 1 a la SE 8 se han notificado 266 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 125 han sido descartado para estas dos enfermedades.

Vigilancia de las Parálisis Fláccida Aguda en < de 15 años (PFA) para poliomielitis: desde la SE 1 a la SE 8 se han notificado 2 casos de PFA correspondiente a la XI RS.

Coqueluche: Desde la SE 1 a la SE 8 se han notificado 10 casos sospechosos de las cuales 4 fueron descartados, 1 caso confirmado y 3 quedan pendiente su clasificación.

Parotiditis: desde la SE 1 a la SE 8 se han notificado 47 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Tétanos en otras edades (TOE): Hasta la fecha sin caso reportado.

Varicela: desde la SE 1 a la SE 8 se han notificado 149 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): desde la SE 1 la SE 8 se han reportado 14 casos de ESAVI

Atención: Las regiones que no han notificados casos de EFE hasta la SE 8 (VI, VIII y XVI), deben realizar un control cruzado con la vigilancia de arbovirosis; ya que hemos identificado que han notificado casos con exantema que no ingresaron a la vigilancia de sarampión/rubéola, principalmente aquellos casos que no tienen aún clasificación final de dengue u otra arbovirosis.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2019 – 2020 SE 08

Tasa ideal de EFE a la SE 08 = 0,75

Tasa ideal de PFA a la SE 07 = 0,15

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA												POLIOMIELITIS								
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		% Muest ileg. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa **		
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
Concepción	92	98	88	100	100	100	100	100	100	88	100	3,33	1,99	92	98	0,00	0,00
S. Pedro N	90	76	0	0	100	100	100	...	100	3,01	0,50	90	76	100	...	100	...	1,52	0,00
S. Pedro S	90	85	...	60	...	40	...	0	...	50	...	0,44	2,63	90	85	0,00	0,00
Cordillera	100	99	100	91	100	98	82	91	73	91	...	3,63	14,32	100	99	0,00	0,00
Guairá	96	90	100	100	100	100	100	100	100	100	...	0,90	0,89	96	90	0,00	0,00
Caaguazú	86	90	25	10	75	97	0	27	0	47	...	0,72	5,56	86	90	100	...	100	...	0,58	0,00
Caazapá	99	80	50	...	100	...	83	...	100	3,21	0,00	99	80	0,00	0,00
Itapúa	97	85	75	100	83	100	83	100	67	100	...	2,00	0,33	97	85	0,00	0,00
Misiones	93	100	0	...	100	...	100	...	100	0,80	0,00	93	100	0,00	0,00
Paraguarí	100	100	81	52	94	81	100	75	73	75	...	6,24	20,96	100	100	0,00	0,00
A. Paraná	88	84	85	50	77	100	55	100	73	100	...	1,61	0,24	88	84	0,00	0,00
Central	99	100	51	48	92	84	84	63	74	69	...	4,11	2,97	99	100	100	100	0	100	0,17	0,34
Ñeembucú	100	100	...	82	...	100	...	73	...	73	...	0,00	12,25	100	100	0,00	0,00
Amambay	100	100	100	100	89	100	63	86	50	86	...	10,78	8,25	100	100	0,00	0,00
Canindeyú	87	83	67	100	100	100	67	100	67	100	...	1,77	0,43	87	83	0,00	0,00
Pdte. Hayes	94	100	100	43	100	43	100	33	60	33	...	4,05	5,57	94	100	0,00	0,00
Boquerón	100	94	100	...	100	...	100	...	0	1,56	0,00	100	94	0,00	0,00
A. Paraguay	100	100	0	0	100	100	100	100	0	100	...	5,70	5,59	100	100	0,00	0,00
Asunción	99	98	96	86	96	76	88	69	60	75	...	4,97	4,02	99	98	0,00	0,00
Total País	95	92	71	60	91	87	82	69	69	74	3,14	3,72	95	92	100	100	67	100	0,19	0,10	

* Tasa mínima esperada de EFE - 5:100.000 habitantes.

** Tasa mínima esperada de PAF - 1:100.000 < 15 años.

... No corresponde por ausencia de notificación de casos

Último caso registrado de Sarampión en 1998, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomielitis en 1985.

Pobl. Gral: 7.152.703 – Pobl. < 15 años: 2.091.813

En la tabla N° 2. Se presentan los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomielitis**; recordando que el mínimo requerido es de 80% por indicador, pero nuestro país se ha propuesto alcanzar el 95% en cada región sanitaria por el riesgo de reintroducción del sarampión/ rubéola.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Actualmente el país cuenta con 1.288 unidades notificadoras. De la SE 1 a la 8 se ha alcanzado un porcentaje acumulado de 92 % en este indicador.

Se recuerda a las regiones realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos reportados en la planilla de ENO con el número de casos notificados por notificación individual por ficha epidemiológica.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: La tasa de notificación ideal a la SE 8 debe ser de **0,75** casos de EFE por 100.000 Hts; 12 regiones han alcanzado la tasa esperada para esta semana. Pero la capacidad de respuesta del país dentro de las 48 hs a nivel de los servicios de salud, no se ha cumplido. Tabla 2.

La capacidad de respuesta de las regiones dentro de las 48 Hs, es de suma importancia para controlar un posible brote de sarampión o rubéola, evitando la dispersión en la comunidad y que se restablezca en el país.

Indicadores de Vigilancia de la Poliomielitis: desde la SE 1 a la SE 8 se ha reportado 2 casos de PFA que cuenta con el 100% en los indicadores de investigación y muestra adecuada. No se ha cumplido la tasa de notificación mínima para esta vigilancia, por lo que se solicita intensificar la búsqueda activa de casos de PFA en menores de 15 años. Tabla 2

OBS: Es importante que cada región realice el análisis de sus indicadores, a fin de verificar y comparar la calidad de sus datos; e identificar a tiempo los problemas que dificultan el cumplimiento de los mismos; y realizar intervenciones oportunas que eviten la reintroducción de enfermedades y/o la propagación de las mismas.