



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 10 - 2020.

REGION SANITARIA	PFA			EFE			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS			TNN			TOE			VARICELA			ESAVI		
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	C. Fin
Concepción	0	10	7	0	0	0	1	0	1	0	0	4	...	4	1	0	1
S. Pedro N.	0	3	0	...	0	0	0	0	0	1	...	1	0
S. Pedro S.	0	13	8	0	0	0	1	0	1	0	0	12	...	12	1
Cordillera	0	49	26	0	0	0	2	0	2	0	0	7	0	7	0
Guairá	0	6	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Caaguazú	0	32	16	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	...	1	1
Caazapá	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Itapúa	0	3	2	0	0	0	0	0	0	20	0	20	2
Misiones	0	5	3	...	0	2	2	0	0	0	0	4	0	4	0
Paraguarí	0	76	39	0	0	0	7	0	7	0	0	20	0	20	1
A. Paraná	0	2	1	0	0	0	6	0	6	0	0	9	0	9	0
Central	2	76	38	0	0	9	2	3	22	0	22	0	0	50	0	50	5
Ñeembucú	0	17	9	0	0	0	1	0	1	0	0	3	0	3	0
Amambay	0	17	12	0	0	1	1	0	2	0	2	0	0	4	0	4	0
Canindeyú	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Pdte. Hayes	0	9	4	0	0	1	0	1	0	0	0	11	0	11	0
Boquerón	0	3	1	...	0	1	1	0	1	0	1	0	0	3	0	3	0
A. Paraguayo	0	1	...	0	0	0	0	0	0	0	0
Asunción	0	23	15	0	1	2	1	...	8	0	8	0	0	34	0	34	3	0	1
Total País	2	0	0	346	184	0	1	0	0	17	8	4	53	0	53	0	0	0	0	184	0	184	14	0	2

Notif: Casos sospechosos notificados desde la SE 10- 2020.

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI de la SE 1 a la 10 del 2020, notificados por las regiones sanitarias.

Desde la SE 1 a la SE 10 el **país no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, poliomielitis, difteria, tétanos en otras edades y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: desde la SE 1 a la SE 10 se han notificado 346 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 184 han sido descartado para estas dos enfermedades.

Vigilancia de las Parálisis Fláccida Aguda en < de 15 años (PFA) para poliomielitis: desde la SE 1 a la SE 10 se han notificado 2 casos de PFA correspondiente a la XI RS.

Coqueluche: Desde la SE 1 a la SE 10 se han notificado 17 casos sospechosos de las cuales 8 fueron descartados, 4 casos confirmados y 5 quedan pendiente su clasificación final.

Parotiditis: desde la SE 1 a la SE 10 se han notificado 53 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Tétanos en otras edades (TOE): Hasta la fecha sin caso reportado.

Varicela: desde la SE 1 a la SE 10 se han notificado 184 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): desde la SE 1 la SE 10 se han reportado 14 casos de ESAVI

Atención: La región que no han notificado casos de EFE hasta la SE 10 (VI), debe realizar un control cruzado con la vigilancia de arbovirosis; ya que hemos identificado que han notificado casos con exantema que no ingresaron a la vigilancia de sarampión/rubéola, principalmente aquellos casos que no tienen aún clasificación final de dengue u otra arbovirosis.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2019 – 2020 SE 10

Tasa ideal de EFE a la SE 10 = 0,94

Tasa ideal de PFA a la SE 10 = 0,19

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA												POLIOMIELITIS							
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		%Muest ileg. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa **	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Concepción	93	98	90	100	100	90	100	100	70	100	4,16	3,98	93	95	0,00	0,00
S. Pedro N	91	78	100	0	100	100	50	...	100	...	3,01	1,49	91	97	100	...	100	...	1,52	0,00
S. Pedro S	93	85	80	60	100	40	60	0	60	50	2,66	5,70	93	91	0,00	0,00
Cordillera	100	99	100	86	100	98	82	85	73	85	3,63	15,95	100	100	0,00	0,00
Guairá	95	90	100	100	100	67	100	75	100	75	0,90	2,66	95	94	0,00	0,00
Caaguazú	87	90	14	9	86	97	0	26	0	52	1,27	5,74	87	95	100	...	100	...	0,58	0,00
Caazapá	99	80	56	...	100	...	78	...	67	...	4,81	0,00	99	87	0,00	0,00
Itapúa	96	86	53	100	94	100	76	100	59	100	2,83	0,49	96	94	0,00	0,00
Misiones	96	100	67	100	100	60	33	67	100	100	2,40	3,95	96	100	0,00	0,00
Paraguarí	100	100	89	83	100	84	89	77	61	77	7,03	29,50	100	100	0,00	0,00
A. Paraná	88	85	63	50	63	100	47	100	42	100	2,97	0,24	88	89	0,00	0,00
Central	100	100	57	50	90	84	74	62	59	66	5,44	3,52	100	100	100	100	100	100	0,17	0,34
Ñeembucú	100	100	...	100	...	94	...	50	...	50	0,00	18,93	100	100	0,00	0,00
Amambay	100	100	100	88	81	94	64	88	32	88	18,56	10,02	100	100	0,00	0,00
Canindeyú	88	84	83	100	100	100	50	100	33	100	2,65	0,43	88	99	0,00	0,00
Pdte. Hayes	96	100	100	56	100	67	100	50	60	67	4,05	7,16	96	100	0,00	0,00
Boquerón	100	100	100	100	100	67	100	0	0	50	1,56	4,58	100	96	100	...	100	...	5,16	0,00
A. Paraguay	100	100	0	100	100	67	100	0	0	50	5,70	5,59	100	0	0,00	0,00
Asunción	99	98	97	87	93	83	82	84	57	89	5,73	4,40	99	93	0,00	0,00
Total País	95	93	72	67	89	86	73	69	55	74	4,29	4,84	95	95	100	100	100	100	0,19	0,10

* Tasa mínima esperada de EFE - 5:100.000 habitantes.

** Tasa mínima esperada de PAF - 1:100.000 < 15 años.

... No corresponde por ausencia de notificación de casos

Último caso registrado de Sarampión en 1998, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomielitis en 1985.

Pobl. Gral: 7.152.703 – Pobl. < 15 años: 2.091.813

En la tabla N° 2. Se presentan los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomielitis**; recordando que el mínimo requerido es de 80% por indicador, pero nuestro país se ha propuesto alcanzar el 95% en cada región sanitaria por el riesgo de reintroducción del sarampión/ rubéola.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Actualmente el país cuenta con 1.288 unidades notificadoras. De la SE 1 a la 10 se ha alcanzado un porcentaje acumulado de 93 % en este indicador.

Se recuerda a las regiones realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos reportados en la planilla de ENO con el número de casos notificados por notificación individual por ficha epidemiológica.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: La tasa de notificación ideal a la SE 10 debe ser de **0,94** casos de EFE por 100.000 Hts; 15 regiones han alcanzado la tasa esperada para esta semana. Pero la capacidad de respuesta del país dentro de las 48 hs a nivel de los servicios de salud, no se ha cumplido. Tabla 2.

La capacidad de respuesta de las regiones dentro de las 48 Hs, es de suma importancia para controlar un posible brote de sarampión o rubéola, evitando la dispersión en la comunidad y que se restablezca en el país.

Indicadores de Vigilancia de la Poliomielitis: desde la SE 1 a la SE 10 se ha reportado 2 casos de PFA que cuenta con el 100% en los indicadores de investigación y muestra adecuada. No se ha cumplido la tasa de notificación mínima para esta vigilancia, por lo que se solicita intensificar la búsqueda activa de casos de PFA en menores de 15 años. Tabla 2

OBS: Es importante que cada región realice el análisis de sus indicadores, a fin de verificar y comparar la calidad de sus datos; e identificar a tiempo los problemas que dificultan el cumplimiento de los mismos; y realizar intervenciones oportunas que eviten la reintroducción de enfermedades y/o la propagación de las mismas.