



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 12 - 2020.

REGION SANITARIA	PFA			EFE			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS			TNN			TOE			VARICELA			ESAVI		
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	C. Fin
Concepción	0	11	10	0	0	0	1	0	1	0	0	6	...	6	1	0	1
S. Pedro N.	0	5	2	...	0	0	0	0	0	1	...	1	0
S. Pedro S.	0	15	10	0	0	0	1	0	1	0	0	14	...	14	1
Cordillera	0	49	28	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	7	0	7	0
Guairá	0	10	10	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Caaguazú	1	32	17	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	...	1	1
Caazapá	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Itapúa	0	7	5	0	0	0	1	0	1	0	0	21	0	21	2
Misiones	0	6	4	...	0	2	2	0	0	0	0	4	0	4	0
Paraguarí	0	82	52	0	0	0	7	0	7	0	0	20	0	20	1
A. Paraná	0	3	2	0	0	0	7	0	7	0	0	9	0	9	0
Central	2	2	...	84	48	0	1	12	5	4	24	0	24	0	0	54	0	54	5
Ñeembucú	0	18	14	0	0	0	3	0	3	0	0	3	0	3	0
Amambay	0	21	12	0	0	1	1	0	2	0	2	0	0	7	0	7	0
Canindeyú	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Pdte. Hayes	0	10	5	0	0	1	0	1	0	0	0	14	0	14	0
Boquerón	0	3	3	...	0	1	1	0	1	0	1	0	0	3	0	3	0
A. Paraguayo	0	1	...	0	0	0	0	0	0	0	0
Asunción	0	27	18	0	1	2	1	...	9	0	9	0	0	34	0	34	3	0	1
Total País	3	2	0	385	240	0	2	0	0	21	11	6	60	0	60	0	0	0	0	199	0	199	14	0	2

Notif: Casos sospechosos notificados desde la SE 12- 2020.

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI de la SE 1 a la 12 del 2020, notificados por las regiones sanitarias.

Desde la SE 1 a la SE 12 el **país no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, poliomielitis, difteria, tétanos en otras edades y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: desde la SE 1 a la SE 12 se han notificado 385 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 240 han sido descartado para estas dos enfermedades.

Vigilancia de las Parálisis Fláccida Aguda en < de 15 años (PFA) para poliomielitis: desde la SE 1 a la SE 12 se han notificado 3 casos de PFA de las cuales 2 fueron descartado por LCSP.

Coqueluche: desde la SE 1 a la SE 12 se han notificado 21 casos sospechosos de las cuales 11 fueron descartados, 6 casos confirmados y 3 quedan pendiente su clasificación final.

Parotiditis: desde la SE 1 a la SE 12 se han notificado 60 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Tétanos en otras edades (TOE): Hasta la fecha sin caso reportado.

Varicela: desde la SE 1 a la SE 12 se han notificado 199 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): desde la SE 1 la SE 12 se han reportado 14 casos de ESAVI

Atención: La región que no han notificado casos de EFE hasta la SE 12 (VI), debe realizar un control cruzado con la vigilancia de arbovirosis; ya que hemos identificado que han notificado casos con exantema que no ingresaron a la vigilancia de sarampión/rubéola, principalmente aquellos casos que no tienen aún clasificación final de dengue u otra arbovirosis.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2019 – 2020 SE 12

Tasa ideal de EFE a la SE 12 = 1,15

Tasa ideal de PFA a la SE 12 = 0,23

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA												POLIOMIELITIS							
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		%Muest llog. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa **	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Concepción	93	98	82	100	100	100	91	91	64	100	4,57	4,31	93	98	1,19	0,00
S. Pedro N	92	97	100	40	100	40	50	...	100	...	3,51	2,45	91	97	100	...	100	0,00
S. Pedro S	93	97	80	67	100	40	60	0	60	50	2,66	6,50	92	97	0,00
Cordillera	100	100	100	86	92	98	75	90	67	90	4,29	15,74	100	100	0,00
Guairá	95	100	100	100	100	100	100	90	100	90	0,90	4,39	95	100	0,00
Caaguazú	88	96	11	9	89	97	38	29	0	65	1,63	5,68	87	96	100	...	100	100	...	0,58
Caazapá	99	100	58	...	92	...	64	...	55	...	6,42	0,00	99	100	0,00
Itapúa	97	93	56	57	93	100	58	71	38	71	4,50	1,14	97	93	0,00
Misiones	96	100	75	100	75	67	33	75	100	100	3,20	4,68	96	100	0,00
Paraguarí	100	100	92	83	92	89	63	85	46	85	10,15	31,67	100	100	0,00
A. Paraná	88	91	57	67	57	100	42	100	42	100	3,46	0,36	88	91	100	...	100	...	0,40	0,00
Central	100	100	58	54	81	85	67	69	54	75	6,57	3,82	100	100	100	100	50	100	0,35	0,33
Ñeembucú	100	100	...	100	...	94	...	47	...	47	0,00	19,94	100	100	4,46	0,00
Amambay	100	100	100	100	88	90	38	84	21	84	25,14	12,20	100	100	0,00
Canindeyú	89	94	83	100	83	100	40	100	40	100	3,10	0,43	88	94	0,00
Pdte. Hayes	97	100	100	60	100	70	100	57	60	71	4,05	7,82	96	100	0,00
Boquerón	100	96	100	100	100	100	100	0	0	100	1,56	4,49	100	96	100	...	100	0,00
A. Paraguay	100	100	0	0	100	100	100	100	0	100	5,70	5,49	100	100	0,00
Asunción	99	91	92	85	87	85	76	83	47	87	7,45	5,18	99	91	0,00
Total País	96	97	71	71	85	89	62	74	46	80	5,38	5,31	95	97	100	79	83	100	0,24	0,14

* Tasa mínima esperada de EFE - 5:100.000 habitantes.

** Tasa mínima esperada de PAF - 1:100.000 < 15 años.

... No corresponde por ausencia de notificación de casos

Último caso registrado de Sarampión en 1998, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomieltis en 1985.

Pobl. Gral: 7.152.703 – Pobl. < 15 años: 2.091.813

En la tabla N° 2. Se presentan los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomieltis**; recordando que el mínimo requerido es de 80% por indicador, pero nuestro país se ha propuesto alcanzar el 95% en cada región sanitaria por el riesgo de reintroducción del sarampión/ rubéola.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Actualmente el país cuenta con 1.288 unidades notificadoras. De la SE 1 a la 12 se ha alcanzado un porcentaje acumulado de 97 % en este indicador.

Se recuerda a las regiones realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos reportados en la planilla de ENO con el número de casos notificados por notificación individual por ficha epidemiológica.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: La tasa de notificación ideal a la SE 12 debe ser de **1,15** casos de EFE por 100.000 Hts; 15 regiones han alcanzado la tasa esperada para esta semana. Pero la capacidad de respuesta del país dentro de las 48 hs a nivel de los servicios de salud, no se ha cumplido. Tabla 2.

La capacidad de respuesta de las regiones dentro de las 48 Hs, es de suma importancia para controlar un posible brote de sarampión o rubéola, evitando la dispersión en la comunidad y que se restablezca en el país.

Indicadores de Vigilancia de la Poliomieltis: desde la SE 1 a la SE 12 se ha reportado 3 casos de PFA que cuenta con el 79% en los indicadores de investigación y 100% muestra adecuada. No se ha cumplido la tasa de notificación mínima para esta vigilancia, por lo que se solicita intensificar la búsqueda activa de casos de PFA en menores de 15 años. Tabla 2

OBS: Es importante que cada región realice el análisis de sus indicadores, a fin de verificar y comparar la calidad de sus datos; e identificar a tiempo los problemas que dificultan el cumplimiento de los mismos; y realizar intervenciones oportunas que eviten la reintroducción de enfermedades y/o la propagación de las mismas.