



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 13 - 2020.

REGION SANITARIA	PFA			EFE			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS			TNN			TOE			VARICELA			ESAVI		
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	C. Fin
Concepción	0	11	10	0	0	0	1	0	1	0	0	6	...	6	1	0	1
S. Pedro N.	0	5	2	...	0	0	0	0	0	1	...	1	0
S. Pedro S.	0	15	11	0	0	0	1	0	1	0	0	14	...	14	1
Cordillera	0	49	28	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	7	0	7	0
Guairá	0	10	10	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Caaguazú	1	32	17	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	...	1	1
Caazapá	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Itapúa	0	7	5	0	0	0	1	0	1	0	0	21	0	21	2
Misiones	0	8	6	...	0	2	2	0	0	0	0	4	0	4	0
Paraguarí	0	82	52	0	0	0	7	0	7	0	0	20	0	20	1
A. Paraná	0	3	2	0	0	0	7	0	7	0	0	9	0	9	0
Central	2	2	...	84	48	0	1	13	5	4	25	0	25	0	0	54	0	54	6
Ñeembucú	0	18	9	0	0	0	3	0	3	0	0	3	0	3	0
Amambay	0	22	17	0	0	1	1	0	2	0	2	0	0	7	0	7	0
Canindeyú	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Pdte. Hayes	0	10	5	0	0	1	0	1	0	0	0	15	0	15	0
Boquerón	0	4	4	...	0	1	1	0	1	0	1	0	0	3	0	3	0
A. Paraguayo	0	1	...	0	0	0	0	0	0	0	0
Asunción	0	27	18	0	1	2	1	...	9	0	9	0	0	34	0	34	3	0	1
Total País	3	2	0	389	244	0	2	0	0	22	11	6	61	0	61	0	0	0	0	200	0	200	15	0	2

Notif: Casos sospechosos notificados desde la SE 13- 2020.

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI de la SE 1 a la 13 del 2020, notificados por las regiones sanitarias.

Desde la SE 1 a la SE 13 el **país no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, poliomieltis, difteria, tétanos en otras edades y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: desde la SE 1 a la SE 13 se han notificado 389 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 244 han sido descartado para estas dos enfermedades.

Vigilancia de las Parálisis Fláccida Aguda en < de 15 años (PFA) para poliomieltis: desde la SE 1 a la SE 13 se han notificado 3 casos de PFA de las cuales 2 fueron descartado por laboratorio.

Coqueluche: desde la SE 1 a la SE 13 se han notificado 22 casos sospechosos de las cuales 11 fueron descartados, 6 casos confirmados y 3 quedan pendiente su clasificación final.

Parotiditis: desde la SE 1 a la SE 13 se han notificado 61 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Tétanos en otras edades (TOE): Hasta la fecha sin caso reportado.

Varicela: desde la SE 1 a la SE 13 se han notificado 200 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): desde la SE 1 la SE 13 se han reportado 15 casos de ESAVI

Atención: La región que no han notificado casos de EFE hasta la SE 13 (VI), debe realizar un control cruzado con la vigilancia de arbovirosis; ya que hemos identificado que han notificado casos con exantema que no ingresaron a la vigilancia de sarampión/rubéola, principalmente aquellos casos que no tienen aún clasificación final de dengue u otra arbovirosis.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2019 – 2020 SE 13

Tasa ideal de EFE a la SE 13 = 1,23

Tasa ideal de PFA a la SE 13 = 0,25

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA											POLIOMIELITIS								
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		% Muest llog. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa **		
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Concepción	94	97	91	100	100	100	91	91	64	100	4,57	4,38	94	98	0,00	0,00
S. Pedro N	92	84	100	40	100	40	50	...	100	...	3,51	7,43	92	97	100	...	100	...	1,52	0,00
S. Pedro S	94	88	80	67	100	40	60	0	60	50	2,66	6,57	94	97	0,00	0,00
Cordillera	100	99	87	86	93	98	79	90	57	90	4,95	15,95	100	100	0,00	0,00
Guairá	95	92	100	100	100	100	100	90	100	90	0,90	4,44	95	100	0,00	0,00
Caaguazú	89	92	7	9	93	97	38	29	0	55	2,54	5,74	89	96	100	...	100	100	0,58	0,58
Caazapá	99	85	58	...	92	...	64	...	55	...	6,42	0,00	99	100	0,00	0,00
Itapúa	97	89	55	57	90	100	67	71	37	71	4,83	1,15	97	93	0,00	0,00
Misiones	97	100	60	100	80	75	25	83	75	100	4,00	6,32	97	100	0,00	0,00
Paraguarí	100	100	92	83	92	89	67	85	46	85	10,15	31,83	100	100	0,00	0,00
A. Paraná	89	87	57	67	60	100	38	100	38	100	3,71	0,37	89	91	100	...	100	...	0,40	0,00
Central	100	100	58	54	81	85	64	69	52	75	6,86	3,89	100	100	100	100	50	100	0,35	0,33
Ñeembucú	100	100	50	100	100	94	0	47	0	47	2,24	20,05	100	100	0,00	0,00
Amambay	100	100	93	100	89	95	45	90	19	90	26,14	12,97	100	100	0,00	0,00
Canindeyú	90	88	86	100	86	100	33	100	33	100	3,10	0,43	90	94	0,00	0,00
Pdte. Hayes	97	100	100	60	100	70	100	57	60	71	4,05	7,96	97	100	0,00	0,00
Boquerón	100	95	100	75	100	100	100	25	0	100	1,56	6,10	100	96	100	...	100	...	5,16	0,00
A. Paraguay	100	92	0	0	100	100	100	100	0	100	5,70	5,59	100	100	0,00	0,00
Asunción	99	96	93	85	90	85	71	83	42	87	8,03	5,18	99	91	0,00	0,00
Total País	96	94	70	72	85	90	61	74	43	80	5,75	5,44	96	97	100	79	83	100	0,29	0,14

* Tasa mínima esperada de EFE - 5:100.000 habitantes.

** Tasa mínima esperada de PAF - 1:100.000 < 15 años.

... No corresponde por ausencia de notificación de casos

Último caso registrado de Sarampión en 1998, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomielitis en 1985.

Pobl. Gral: 7.152.703 – Pobl. < 15 años: 2.091.813

En la tabla N° 2. Se presentan los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomielitis**; recordando que el mínimo requerido es de 80% por indicador, pero nuestro país se ha propuesto alcanzar el 95% en cada región sanitaria por el riesgo de reintroducción del sarampión/ rubéola.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Actualmente el país cuenta con 1.288 unidades notificadoras. De la SE 1 a la 13 se ha alcanzado un porcentaje acumulado de 94 % en este indicador.

Se recuerda a las regiones realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos reportados en la planilla de ENO con el número de casos notificados por notificación individual por ficha epidemiológica.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: La tasa de notificación ideal a la SE 13 debe ser de **1,23** casos de EFE por 100.000 Hts; 15 regiones han alcanzado la tasa esperada para esta semana. Pero la capacidad de respuesta del país dentro de las 48 hs a nivel de los servicios de salud, no se ha cumplido. Tabla 2.

La capacidad de respuesta de las regiones dentro de las 48 Hs, es de suma importancia para controlar un posible brote de sarampión o rubéola, evitando la dispersión en la comunidad y que se restablezca en el país.

Indicadores de Vigilancia de la Poliomielitis: desde la SE 1 a la SE 13 se ha reportado 3 casos de PFA que cuenta con el 79% en los indicadores de investigación y 100% muestra adecuada. No se ha cumplido la tasa de notificación mínima para esta vigilancia, por lo que se solicita intensificar la búsqueda activa de casos de PFA en menores de 15 años. Tabla 2

OBS: Es importante que cada región realice el análisis de sus indicadores, a fin de verificar y comparar la calidad de sus datos; e identificar a tiempo los problemas que dificultan el cumplimiento de los mismos; y realizar intervenciones oportunas que eviten la reintroducción de enfermedades y/o la propagación de las mismas.