



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 15 - 2020.

REGION SANITARIA	PFA			EFE			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS			TNN			TOE			VARICELA			ESAVI		
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	C. Fin
Concepción	0	11	11	0	0	0	1	0	1	0	0	6	...	6	1	0	1
S. Pedro N.	0	5	2	...	0	0	0	0	0	1	...	1	0
S. Pedro S.	0	16	11	0	0	0	1	0	1	0	0	18	...	18	1
Cordillera	0	49	42	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	7	0	7	0
Guairá	0	10	10	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Caaguazú	1	33	31	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	...	1	1
Caazapá	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Itapúa	0	7	5	0	0	0	1	0	1	0	0	22	0	22	2
Misiones	0	8	6	...	0	2	2	0	0	0	0	4	0	4	0
Paraguarí	0	82	66	0	0	0	7	0	7	0	0	20	0	20	1
A. Paraná	0	4	3	0	0	0	7	0	7	0	0	9	0	9	0
Central	2	2	0	84	59	0	1	1	0	14	5	5	27	0	27	0	0	55	0	55	6
Ñeembucú	0	18	9	0	0	0	3	0	3	0	0	3	0	3	0
Amambay	0	23	22	0	0	1	1	0	2	0	2	0	0	10	0	10	0
Canindeyú	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Pdte. Hayes	0	10	5	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	15	0	15	0
Boquerón	0	4	4	...	0	1	1	0	1	0	1	0	0	3	0	3	0
A. Paraguayo	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Asunción	0	27	24	0	1	1	0	2	1	...	9	0	9	0	0	34	0	34	3	0	1
Total País	3	2	0	393	311	0	2	2	0	23	11	7	64	0	64	0	0	0	0	0	0	209	0	209	15	0	2

Notif: Casos sospechosos notificados desde la SE 15- 2020.

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI de la SE 1 a la 15 del 2020, notificados por las regiones sanitarias.

Desde la SE 1 a la SE 15 el **país no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, poliomieltis, difteria, tétanos en otras edades y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: desde la SE 1 a la SE 15 se han notificado 393 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 311 han sido descartado para estas dos enfermedades.

Vigilancia de las Parálisis Fláccida Aguda en < de 15 años (PFA) para poliomieltis: desde la SE 1 a la SE 15 se han notificado 3 casos de PFA de las cuales 2 fueron descartado por laboratorio.

Coqueluche: Se ha confirmado un nuevo caso, corresponde a un menor de 8 meses de edad, con domicilio en el distrito de San Antonio – Dpto. Central. Desde la SE 1 a la SE 15 se han notificado 23 casos sospechosos de las cuales 11 fueron descartados, 7 casos confirmados y 5 quedan pendiente su clasificación final.

Parotiditis: desde la SE 1 a la SE 15 se han notificado 64 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Tétanos en otras edades (TOE): Hasta la fecha sin caso reportado.

Varicela: desde la SE 1 a la SE 15 se han notificado 209 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): desde la SE 1 a la SE 15 se han reportado 15 casos de ESAVI

Atención: La región que no han notificado casos de EFE hasta la SE 15 (VI), debe realizar un control cruzado con la vigilancia de arbovirosis; ya que hemos identificado que han notificado casos con exantema que no ingresaron a la vigilancia de sarampión/rubéola, principalmente aquellos casos que no tienen aún clasificación final de dengue u otra arbovirosis.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2019 – 2020 SE 15

Tasa ideal de EFE a la SE 15 = 1,42

Tasa ideal de PFA a la SE 15 = 0,28

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA											POLIOMIELITIS								
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		%Muest llog. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa **		
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Concepción	94	98	79	100	100	100	86	91	57	100	5,82	4,31	94	98	0,00	0,00
S. Pedro N	92	86	100	40	100	40	50	...	100	...	4,02	2,45	92	86	100	...	100	...	1,52	0,00
S. Pedro S	94	89	100	67	100	40	60	0	60	50	2,66	6,93	94	89	0,00	0,00
Cordillera	100	99	90	86	95	98	84	90	63	90	6,60	15,74	100	99	0,00	0,00
Guairá	95	93	100	100	100	100	100	90	100	90	1,34	4,39	95	93	0,00	0,00
Caaguazú	89	93	9	9	96	97	50	31	27	94	4,17	5,85	89	93	100	...	100	100	0,58	0,58
Caazapá	99	87	58	...	92	...	64	...	64	...	6,42	0,00	99	87	0,00	0,00
Itapúa	97	90	56	57	94	100	67	71	36	71	5,67	1,14	97	90	0,00	0,00
Misiones	97	100	63	100	75	75	17	83	50	100	6,40	6,24	97	100	0,00	0,00
Paraguarí	100	100	93	83	97	91	75	89	43	89	11,32	31,67	100	100	0,00	0,00
A. Paraná	89	87	55	75	68	75	42	100	46	100	3,84	0,48	89	87	100	...	100	...	0,40	0,00
Central	100	100	57	54	83	85	70	79	54	85	7,66	3,82	100	100	100	100	50	100	0,35	0,33
Ñeembucú	100	100	40	100	60	94	100	50	33	47	5,60	19,94	100	100	0,00	0,00
Amambay	100	100	94	100	88	96	59	100	22	100	29,93	13,36	100	100	0,00	0,00
Canindeyú	90	89	75	100	88	100	57	100	57	100	3,54	0,43	90	89	0,00	0,00
Pdte. Hayes	97	100	83	60	83	70	100	57	60	71	4,86	7,82	97	100	0,00	0,00
Boquerón	100	95	100	75	100	100	50	25	50	100	3,11	5,98	100	95	100	...	100	...	5,16	0,00
A. Paraguay	100	93	0	0	100	100	100	100	0	100	5,70	5,49	100	93	0,00	0,00
Asunción	99	96	94	85	96	93	83	84	38	92	9,37	5,18	99	96	0,00	0,00
Total País	96	94	68	72	87	90	68	78	45	88	6,68	5,42	96	94	100	79	83	100	0,29	0,14

* Tasa mínima esperada de EFE - 5:100.000 habitantes.

** Tasa mínima esperada de PAF - 1:100.000 < 15 años.

... No corresponde por ausencia de notificación de casos

Último caso registrado de Sarampión en 1998, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomielitis en 1985.

Pobl. Gral: 7.252.672 – Pobl. < 15 años: 2.096.380

En la tabla N° 2. Se presentan los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomielitis**; recordando que el mínimo requerido es de 80% por indicador, pero nuestro país se ha propuesto alcanzar el 95% en cada región sanitaria por el riesgo de reintroducción del sarampión/ rubéola.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Actualmente el país cuenta con 1.288 unidades notificadoras. De la SE 1 a la SE 15 se ha alcanzado un porcentaje acumulado de 94 % en este indicador.

Se recuerda a las regiones realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos reportados en la planilla de ENO con el número de casos notificados por notificación individual por ficha epidemiológica.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: La tasa de notificación ideal a la SE 15 debe ser de **1,42** casos de EFE por 100.000 Hts; 15 regiones han alcanzado la tasa esperada para esta semana. Pero la capacidad de respuesta del país dentro de las 48 hs a nivel de los servicios de salud, no se ha cumplido. Tabla 2.

La capacidad de respuesta de las regiones dentro de las 48 Hs, es de suma importancia para controlar un posible brote de sarampión o rubéola, evitando la dispersión en la comunidad y que se restablezca en el país.

Indicadores de Vigilancia de la Poliomielitis: desde la SE 1 a la SE 15 se ha reportado 3 casos de PFA que cuenta con el 79% en los indicadores de investigación y 100% muestra adecuada. No se ha cumplido la tasa de notificación mínima para esta vigilancia, por lo que se solicita intensificar la búsqueda activa de casos de PFA en menores de 15 años. Tabla 2

OBS: Es importante que cada región realice el análisis de sus indicadores, a fin de verificar y comparar la calidad de sus datos; e identificar a tiempo los problemas que dificultan el cumplimiento de los mismos; y realizar intervenciones oportunas que eviten la reintroducción de enfermedades y/o la propagación de las mismas.