



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 16 - 2020.

REGION SANITARIA	PFA			EFE			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS			TNN			TOE			VARICELA			ESAVI		
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	C. Fin
Concepción	0	11	11	0	0	0	1	0	1	0	0	6	...	6	1	0	1
S. Pedro N.	0	5	2	...	0	0	0	0	0	1	...	1	0
S. Pedro S.	0	16	13	0	0	0	1	0	1	0	0	18	...	18	1
Cordillera	0	50	45	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	7	0	7	0
Guairá	0	10	10	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	...	1
Caaguazú	1	33	31	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	...	1	1
Caazapá	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Itapúa	0	8	7	0	0	0	2	0	1	0	0	22	0	22	3
Misiones	0	8	8	...	0	2	2	0	0	0	0	4	0	4	0
Paraguarí	0	84	76	0	0	0	7	0	7	0	0	24	0	24	1
A. Paraná	0	5	3	0	0	0	7	0	7	0	0	9	0	9	0
Central	2	2	0	83	65	0	1	1	0	14	5	5	27	0	27	0	0	55	0	55	6
Ñeembucú	0	19	9	0	0	0	3	0	3	0	0	3	0	3	0
Amambay	0	23	23	0	0	1	1	0	2	0	2	0	0	10	0	10	0
Canindeyú	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Pdte. Hayes	0	10	7	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	15	0	15	0
Boquerón	0	4	4	...	0	1	1	0	1	0	1	0	0	3	0	3	0
A. Paraguayo	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Asunción	0	27	26	0	1	1	0	2	1	...	9	0	9	0	0	34	0	34	4	0	2
Total País	3	2	0	398	341	0	2	2	0	23	11	7	66	0	66	0	0	0	0	0	0	213	0	213	18	0	2

Notif: Casos sospechosos notificados desde la SE 16- 2020.

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI de la SE 1 a la 16 del 2020, notificados por las regiones sanitarias.

Desde la SE 1 a la SE 16 el **país no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, poliomielitis, difteria, tétanos en otras edades y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: desde la SE 1 a la SE 16 se han notificado 398 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 341 han sido descartado para estas dos enfermedades.

Vigilancia de las Parálisis Fláccida Aguda en < de 15 años (PFA) para poliomielitis: desde la SE 1 a la SE 16 se han notificado 3 casos de PFA de las cuales 2 fueron descartado por laboratorio.

Coqueluche: desde la SE 1 a la SE 16 se han notificado 23 casos sospechosos de las cuales 11 fueron descartados, 7 casos confirmados y 5 quedan pendiente su clasificación final.

Parotiditis: desde la SE 1 a la SE 16 se han notificado 66 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Tétanos en otras edades (TOE): Hasta la fecha sin casos reportados.

Varicela: desde la SE 1 a la SE 16 se han notificado 213 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): desde la SE 1 la SE 15 se han reportado 18 casos de ESAVI

Atención: La región que no han notificado casos de EFE hasta la SE 16 (VI), debe realizar un control cruzado con la vigilancia de arbovirosis; ya que hemos identificado que han notificado casos con exantema que no ingresaron a la vigilancia de sarampión/rubéola, principalmente aquellos casos que no tienen aún clasificación final de dengue u otra arbovirosis.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2019 – 2020 SE 16

Tasa ideal de EFE a la SE 16 = 1,51

Tasa ideal de PFA a la SE 16 = 0,30

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA											POLIOMIELITIS								
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		% Muest ileg. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa **	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Concepción	97	98	69	100	88	100	86	91	57	100	6,65	4,31	97	98	0,00	0,00
S. Pedro N	91	87	100	33	100	33	50	0	100	0	4,52	2,45	91	87	100	...	100	...	1,52	0,00
S. Pedro S	98	90	100	72	100	78	60	88	60	100	2,22	6,93	98	90	0,00	0,00
Cordillera	100	99	90	86	95	98	85	94	63	94	6,93	16,06	100	99	0,00	0,00
Guairá	97	93	100	100	100	100	100	90	100	90	1,34	4,39	97	93	0,00	0,00
Caaguazú	90	93	90	9	88	97	50	31	27	94	4,53	5,85	90	93	100	...	100	100	0,57	0,58
Caazapá	100	88	58	...	92	...	64	...	64	...	6,95	0,00	100	88	0,00	0,00
Itapúa	99	91	48	63	81	100	69	88	36	88	7,00	1,30	99	91	0,00	0,00
Misiones	100	100	63	100	75	88	17	88	50	100	6,40	6,24	100	100	0,00	0,00
Paraguarí	100	100	93	92	93	94	75	90	43	96	11,71	32,44	100	100	0,00	0,00
A. Paraná	87	87	59	60	71	60	56	100	46	100	5,32	0,60	87	87	100	...	100	...	0,40	0,00
Central	100	100	53	53	77	87	71	86	54	90	8,32	3,77	100	100	100	100	50	100	0,35	0,33
Ñeembucú	100	100	25	95	50	95	100	50	33	50	10,08	21,04	100	100	0,00	0,00
Amambay	100	100	94	100	86	100	59	100	22	100	30,53	13,36	100	100	0,00	0,00
Canindeyú	98	90	75	100	88	100	57	100	57	100	3,54	0,43	98	90	0,00	0,00
Pdte. Hayes	100	100	71	60	86	70	100	71	60	100	5,67	7,82	100	100	0,00	0,00
Boquerón	100	95	100	75	100	100	50	25	50	100	3,11	5,98	100	95	100	...	100	...	5,16	0,00
A. Paraguay	100	94	0	0	100	100	100	100	0	100	11,40	5,49	100	94	0,00	0,00
Asunción	100	95	91	85	92	93	84	92	38	100	10,13	5,18	100	95	0,00	0,00
Total País	97	95	65	73	83	92	83	82	45	92	7,42	5,49	97	95	100	79	83	100	0,29	0,14

* Tasa mínima esperada de EFE - 5:100.000 habitantes.

** Tasa mínima esperada de PAF - 1:100.000 < 15 años.

... No corresponde por ausencia de notificación de casos

Último caso registrado de Sarampión en 1998, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomielitis en 1985.

Pobl. Gral: 7.252.672 – Pobl. < 15 años: 2.096.380

En la tabla N° 2. Se presentan los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomielitis**; recordando que el mínimo requerido es de 80% por indicador, pero nuestro país se ha propuesto alcanzar el 95% en cada región sanitaria por el riesgo de reintroducción del sarampión/ rubéola.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Actualmente el país cuenta con 1.291 unidades notificadoras. De la SE 1 a la SE 16 se ha alcanzado un porcentaje acumulado de 95 % en este indicador.

Se recuerda a las regiones realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos reportados en la planilla de ENO con el número de casos notificados por notificación individual por ficha epidemiológica.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: La tasa de notificación ideal a la SE 16 debe ser de **1,51** casos de EFE por 100.000 Hts; 15 regiones han alcanzado la tasa esperada para esta semana. Pero la capacidad de respuesta del país dentro de las 48 hs a nivel de los servicios de salud, no se ha cumplido. Tabla 2.

La capacidad de respuesta de las regiones dentro de las 48 Hs, es de suma importancia para controlar un posible brote de sarampión o rubéola, evitando la dispersión en la comunidad y que se restablezca en el país.

Indicadores de Vigilancia de la Poliomielitis: desde la SE 1 a la SE 16 se ha reportado 3 casos de PFA que cuenta con el 79% en los indicadores de investigación y 100% muestra adecuada. No se ha cumplido la tasa de notificación mínima para esta vigilancia, por lo que se solicita intensificar la búsqueda activa de casos de PFA en menores de 15 años. Tabla 2

OBS: Es importante que cada región realice el análisis de sus indicadores, a fin de verificar y comparar la calidad de sus datos; e identificar a tiempo los problemas que dificultan el cumplimiento de los mismos; y realizar intervenciones oportunas que eviten la reintroducción de enfermedades y/o la propagación de las mismas.