



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1 A LA 25 - 2020.

REGION SANITARIA	PFA			EFE			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS			TNN			TOE			VARICELA			ESAVI		
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	C. Fin
Concepción	0	13	13	0	0	0	1	0	1	0	0	7	...	7	2	0	2
S. Pedro N.	0	3	0	...	0	0	0	0	0	1	...	1	0
S. Pedro S.	0	17	16	0	0	0	1	0	1	0	0	18	...	18	1	0	1
Cordillera	0	59	56	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	7	0	7	0
Guairá	0	12	12	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	...	1
Caaguazú	1	35	33	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	2	...	2	1	0	1
Caazapá	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Itapúa	0	9	9	0	0	1	1	...	3	0	3	0	0	23	0	23	3	...	3
Misiones	0	11	10	...	0	2	2	0	0	0	0	4	0	4	1	0	1
Paraguarí	0	90	85	0	0	0	8	0	8	0	0	29	0	29	1	0	1
A. Paraná	0	7	4	0	0	2	...	1	7	0	7	0	0	11	0	10	0
Central	3	2	0	111	90	0	2	2	0	19	6	6	34	0	34	0	1	...	1	69	0	69	10	0	10
Ñeembucú	0	26	23	0	0	0	4	0	4	0	0	4	0	4	0
Amambay	0	30	30	0	0	1	1	0	3	0	3	0	0	10	0	10	0
Canindeyú	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Pdte. Hayes	0	10	8	0	0	1	0	1	5	0	5	0	0	18	0	18	0
Boquerón	0	4	4	...	0	1	1	0	1	0	1	0	0	3	0	3	0
A. Paraguay	0	1	1	0	0	0	5	0	5	0	0	4	...	4	0
Asunción	0	29	27	0	1	1	0	5	1	2	11	0	11	0	0	40	0	40	8	0	8
Total País	4	2	0	468	422	0	3	3	0	34	13	11	88	0	88	0	0	0	1	0	1	251	0	251	30	0	30

Notif: Casos sospechosos notificados desde la SE 1 a la 25 - 2020.

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI de la SE 1 a la 25 del 2020, notificados por las regiones sanitarias.

Desde la SE 1 a la SE 25 el **país no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, poliomieltis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: desde la SE 1 a la SE 25 se han notificado 468 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 422 han sido descartado para estas dos enfermedades.

Vigilancia de las Parálisis Fláccida Aguda en < de 15 años (PFA) para poliomieltis: desde la SE 1 a la SE 25 se han notificado 4 casos de PFA de las cuales 2 fueron descartado por laboratorio.

Coqueluche: desde la SE 1 a la SE 25 se han notificado 34 casos sospechosos de las cuales 13 fueron descartados, 11 casos confirmados y 8 quedan pendiente su clasificación final.

Parotiditis: desde la SE 1 a la SE 25 se han notificado 88 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Tétanos en otras edades (TOE): desde la SE 1 a la SE 25 se ha confirmado 1 caso de TOE.

Varicela: desde la SE 1 a la SE 25 se han notificado 251 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): desde la SE 1 a la SE 25 se han reportado 30 casos de ESAVI

Atención: La región que no han notificado casos de EFE hasta la SE 25 (VI), debe realizar un control cruzado con la vigilancia de arbovirosis; ya que hemos identificado que han notificado casos con exantema que no ingresaron a la vigilancia de sarampión/rubéola, principalmente aquellos casos que no tienen aún clasificación final de dengue u otra arbovirosis.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2019 – 2020 SE 25

Tasa ideal de EFE a la SE 25 = 2,35

Tasa ideal de PFA a la SE 25 = 0,47

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA											POLIOMIELITIS								
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		%Muest llog. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa **		
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Concepción	94	98	81	100	100	100	88	92	63	100	6,65	5,10	94	98	0,00	0,00
S. Pedro N	92	90	100	33	100	33	50	0	100	0	6,53	1,47	92	89	100	...	100	...	1,52	0,00
S. Pedro S	96	93	100	83	100	89	60	88	60	100	4,88	7,37	96	92	0,00	0,00
Cordillera	96	100	91	88	93	98	80	98	71	95	14,51	18,95	96	100	0,00	0,00
Guairá	96	95	100	100	100	100	100	100	92	100	5,83	5,27	96	95	0,00	0,00
Caaguazú	89	95	26	11	80	97	49	35	53	94	11,06	6,21	89	95	50	0	100	100	1,15	0,58
Caazapá	99	92	69	...	100	...	62	...	69	...	6,95	0,00	99	92	0,00	0,00
Itapúa	98	93	62	56	90	100	75	89	53	100	9,83	1,46	98	93	50	...	100	...	1,06	0,00
Misiones	98	100	57	100	86	82	50	91	67	100	11,20	8,59	98	100	0,00	0,00
Paraguarí	100	100	88	91	95	96	78	90	56	98	22,64	34,75	100	100	0,00	0,00
A. Paraná	85	91	61	43	73	57	49	75	49	100	6,31	0,84	85	90	100	...	100	...	0,40	0,00
Central	100	100	53	55	78	86	78	89	65	94	15,22	5,04	100	100	75	100	50	67	0,69	0,50
Ñeembucú	99	100	50	100	80	96	56	60	63	60	22,40	28,80	99	100	0,00	0,00
Amambay	100	100	95	100	89	100	75	100	31	100	34,12	17,42	100	100	0,00	0,00
Canindeyú	93	93	67	100	89	100	63	100	63	100	3,98	0,43	93	92	0,00	0,00
Pdte. Hayes	98	99	54	60	85	80	75	63	58	100	10,54	7,82	98	99	0,00	0,00
Boquerón	99	95	100	75	100	100	50	25	50	100	3,11	5,98	99	95	100	...	100	...	5,16	0,00
A. Paraguay	96	96	0	0	50	100	100	100	0	100	11,40	5,49	96	96	0,00	0,00
Asunción	99	97	91	90	91	90	82	92	54	100	16,44	5,56	99	97	0,00	0,00
Total País	96	96	65	74	84	92	74	84	59	94	12,26	6,45	96	96	73	75	82	75	0,53	0,19

* Tasa mínima esperada de EFE - 5:100.000 habitantes.

** Tasa mínima esperada de PAF - 1:100.000 < 15 años.

... No corresponde por ausencia de notificación de casos

Último caso registrado de Sarampión en 1998, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomielitis en 1985.

Pobl. Gral: 7.252.672 – Pobl. < 15 años: 2.096.380

En la tabla N° 2. Se presentan los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomielitis**; recordando que el mínimo requerido es de 80% por indicador, pero nuestro país se ha propuesto alcanzar el 96% en cada región sanitaria por el riesgo de reintroducción del sarampión/ rubéola.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Actualmente el país cuenta con 1.291 unidades notificadoras. De la SE 1 a la SE 25 se ha alcanzado un porcentaje acumulado de 96% en este indicador.

Se recuerda a las regiones realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos reportados en la planilla de ENO con el número de casos notificados por notificación individual por ficha epidemiológica.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: La tasa de notificación ideal a la SE 25 debe ser de 2,35 casos de EFE por 100.000 Hts; 14 regiones han alcanzado la tasa esperada para esta semana. Pero la capacidad de respuesta del país dentro de las 48 hs a nivel de los servicios de salud, no se ha cumplido. Tabla 2.

La capacidad de respuesta de las regiones dentro de las 48 Hs, es de suma importancia para controlar un posible brote de sarampión o rubéola, evitando la dispersión en la comunidad y que se restablezca en el país.

Indicadores de Vigilancia de la Poliomielitis: desde la SE 1 a la SE 25 se ha reportado 4 casos de PFA que cuenta con el 75% en los indicadores de investigación y muestra adecuada. No se ha cumplido la tasa de notificación mínima para esta vigilancia, por lo que se solicita intensificar la búsqueda activa de casos de PFA en menores de 15 años. Tabla 2

OBS: Es importante que cada región realice el análisis de sus indicadores, a fin de verificar y comparar la calidad de sus datos; e identificar a tiempo los problemas que dificultan el cumplimiento de los mismos; y realizar intervenciones oportunas que eviten la reintroducción de enfermedades y/o la propagación de las mismas.