



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1 A LA 27 - 2020.

REGION SANITARIA	PFA			EFE			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS			TNN			TOE			VARICELA			ESAVI		
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	C. Fin
Concepción	0	13	13	0	0	0	1	0	1	0	0	7	...	7	2	0	2
S. Pedro N.	0	3	0	...	0	0	0	0	0	1	...	1	1
S. Pedro S.	0	17	16	0	0	0	1	0	1	0	0	18	...	18	1	0	1
Cordillera	0	59	56	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	7	0	7	0
Guairá	0	12	12	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	...	1
Caaguazú	1	35	33	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	2	...	2	1	0	1
Caazapá	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Itapúa	1	9	9	0	0	1	1	...	3	0	3	0	0	25	0	25	3	...	3
Misiones	0	11	10	...	0	2	2	0	0	0	0	4	0	4	1	0	1
Paraguarí	0	90	85	0	0	0	8	0	8	0	0	30	0	30	1	0	1
A. Paraná	0	7	4	0	0	2	...	1	7	0	7	0	0	11	0	11	0
Central	3	2	0	113	92	0	2	2	0	20	7	6	35	0	35	0	2	...	1	71	0	71	11	0	11
Ñeembucú	0	26	23	0	0	0	4	0	4	0	0	4	0	4	0
Amambay	0	30	30	0	0	1	1	0	3	0	3	0	0	10	0	10	0
Canindeyú	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Pdte. Hayes	0	10	8	0	0	1	0	1	5	0	5	0	0	18	0	18	0
Boquerón	0	4	4	...	0	1	1	0	1	0	1	0	0	3	0	3	0
A. Paraguay	0	1	1	0	0	0	5	0	5	0	0	5	...	5	0
Asunción	0	29	28	0	1	1	0	5	1	3	12	0	12	0	0	43	0	43	11	0	9
Total País	5	2	0	472	425	0	3	3	0	35	14	12	90	0	90	0	0	0	2	0	1	260	0	260	33	0	30

Notif: Casos sospechosos notificados desde la SE 1 a la 27 - 2020.

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI de la SE 1 a la 27 del 2020, notificados por las regiones sanitarias.

Desde la SE 1 a la SE 27 el **país no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, poliomieltis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: desde la SE 1 a la SE 27 se han notificado 472 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 425 han sido descartado para estas dos enfermedades.

Vigilancia de las Parálisis Fláccida Aguda en < de 15 años (PFA) para poliomieltis: desde la SE 1 a la SE 27 se han notificado 5 casos de PFA de las cuales 2 fueron descartado por laboratorio.

Coqueluche: desde la SE 1 a la SE 27 se han notificado 35 casos sospechosos de las cuales 14 fueron descartados, 12 casos confirmados y 9 quedan pendiente su clasificación final.

Parotiditis: desde la SE 1 a la SE 27 se han notificado 90 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Tétanos en otras edades (TOE): Desde la SE 1 a la SE 27 se ha confirmado 1 caso de TOE

Varicela: desde la SE 1 a la SE 27 se han notificado 260 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): desde la SE 1 a la SE 27 se han reportado 33 casos de ESAVI

Atención: Seguir realizando un control cruzado con la vigilancia de arbovirosis; ya que hemos identificado que han notificado casos con exantema que no ingresaron a la vigilancia de sarampión/rubéola, principalmente aquellos casos que no tienen aún clasificación final de dengue u otra arbovirosis, insistiendo en los distritos silenciosos.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2019 – 2020 SE 27

Tasa ideal de EFE a la SE 27 = 2,55

Tasa ideal de PFA a la SE 27 = 0,51

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA											POLIOMIELITIS								
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		% Muest llog. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa **		
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Concepción	94	98	82	100	100	100	88	92	65	100	7,07	5,10	94	98	0,00	0,00
S. Pedro N	92	91	100	33	100	33	50	0	100	0	6,53	1,47	92	91	100	...	100	...	1,52	0,00
S. Pedro S	96	93	100	83	100	89	60	88	60	100	4,88	7,37	96	93	0,00	0,00
Cordillera	96	100	91	88	93	98	80	98	71	95	14,51	18,95	96	100	100	...	100	...	1,19	0,00
Guairá	96	95	100	100	100	100	100	100	92	100	5,83	5,27	96	95	0,00	0,00
Caaguazú	89	96	28	11	82	97	51	35	64	94	11,78	6,21	89	96	50	0	100	100	1,15	0,58
Caazapá	99	93	69	100	100	100	62	...	69	...	6,95	1,04	99	93	0,00	0,00
Itapúa	98	94	65	56	90	100	78	89	58	100	10,33	1,46	98	94	50	100	100	100	1,06	0,53
Misiones	98	100	67	100	80	82	50	91	67	100	12,00	8,59	98	100	0,00	0,00
Paraguarí	100	100	88	91	95	96	84	90	63	98	23,03	34,75	100	100	0,00	0,00
A. Paraná	85	91	61	43	75	57	50	75	48	100	6,31	0,84	85	91	100	...	100	...	0,40	0,00
Central	100	100	54	54	80	86	80	90	67	94	15,55	5,13	100	100	75	100	50	67	0,69	0,50
Ñeembucú	99	100	52	100	86	96	67	60	67	60	22,40	28,80	99	100	0,00	0,00
Amambay	100	100	95	100	89	100	75	100	31	100	34,12	17,42	100	100	0,00	0,00
Canindeyú	93	93	67	100	89	100	63	100	63	100	3,98	0,43	93	93	0,00	0,00
Pdte. Hayes	99	99	62	60	85	80	83	63	67	100	10,54	7,82	99	99	0,00	0,00
Boquerón	99	95	100	75	100	100	50	25	50	100	3,11	5,98	99	95	100	...	100	...	5,16	0,00
A. Paraguay	96	96	0	0	50	100	100	100	0	100	11,40	5,49	96	96	0,00	0,00
Asunción	99	97	91	90	91	93	82	93	55	100	17,01	5,56	99	97	0,00	0,00
Total País	96	96	66	75	85	92	75	84	61	94	12,56	6,51	96	96	75	80	83	80	0,58	0,24

* Tasa mínima esperada de EFE - 5:100.000 habitantes.

** Tasa mínima esperada de PAF - 1:100.000 < 15 años.

... No corresponde por ausencia de notificación de casos

Último caso registrado de Sarampión en 1998, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomielitis en 1985.

Pobl. Gral: 7.252.672 – Pobl. < 15 años: 2.096.380

En la tabla N° 2. Se presentan los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomielitis**; recordando que el mínimo requerido es de 80% por indicador, pero nuestro país se ha propuesto alcanzar el 95% en cada región sanitaria por el riesgo de reintroducción del sarampión/ rubéola.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Actualmente el país cuenta con 1.291 unidades notificadoras. De la SE 1 a la SE 27 se ha alcanzado un porcentaje acumulado de 96% en este indicador.

Se recuerda a las regiones realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos reportados en la planilla de ENO con el número de casos notificados por notificación individual por ficha epidemiológica.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: La tasa de notificación ideal a la SE 27 debe ser de 2,55 casos de EFE por 100.000 Hts; 14 regiones han alcanzado la tasa esperada para esta semana. Pero la capacidad de respuesta del país dentro de las 48 hs a nivel de los servicios de salud, no se ha cumplido. Tabla 2.

La capacidad de respuesta de las regiones dentro de las 48 Hs, es de suma importancia para controlar un posible brote de sarampión o rubéola, evitando la dispersión en la comunidad y que se restablezca en el país.

Indicadores de Vigilancia de la Poliomielitis: desde la SE 1 a la SE 27 se ha reportado 5 casos de PFA que cuenta con el 80% en los indicadores de investigación y muestra adecuada. No se ha cumplido la tasa de notificación mínima para esta vigilancia, por lo que se solicita intensificar la búsqueda activa de casos de PFA en menores de 15 años. Tabla 2

OBS: Es importante que cada región realice el análisis de sus indicadores, a fin de verificar y comparar la calidad de sus datos; e identificar a tiempo los problemas que dificultan el cumplimiento de los mismos; y realizar intervenciones oportunas que eviten la reintroducción de enfermedades y/o la propagación de las mismas.