



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1 A LA 43 - 2020.

REGION SANITARIA	PFA			EFE			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS			TNN			TOE			VARICELA			ESAVI		
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	C. Fin
Concepción	0	13	13	0	0	0	1	0	1	0	0	10	0	10	3	0	2
S. Pedro N.	1	1	0	4	1	...	0	0	0	0	0	4	0	4	1
S. Pedro S.	0	17	16	0	0	0	1	0	1	0	0	18	0	18	1	0	1
Cordillera	0	59	56	0	0	1	0	1	2	0	2	0	1	0	1	8	0	8	1
Guairá	0	13	13	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0	1	1	...	1
Caaguazú	1	1	0	36	33	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	3	...	3	1	0	1
Caazapá	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Itapúa	2	2	0	12	11	0	0	1	1	...	6	0	6	0	0	33	0	33	3	...	3
Misiones	0	12	11	...	0	2	2	0	0	0	0	5	0	5	1	0	1
Paraguarí	0	90	85	0	0	1	8	0	8	0	0	31	0	31	1	0	1
A. Paraná	1	8	5	0	0	1	...	1	7	0	7	0	1	11	0	11	0
Central	5	3	0	132	104	0	2	2	0	22	7	7	42	0	42	0	2	...	2	85	0	85	17	0	13
Ñeembucú	1	1	0	31	26	0	0	0	7	0	7	0	0	10	0	10	0
Amambay	0	31	31	0	0	1	1	0	3	0	3	0	0	13	0	13	1
Canindeyú	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Pdte. Hayes	0	15	12	0	0	1	0	1	8	0	8	0	0	24	0	24	2	...	1
Boquerón	0	4	4	...	0	1	1	0	1	0	1	0	0	4	0	4	0
A. Paraguay	0	1	1	0	0	0	5	0	5	0	0	8	0	8	3
Asunción	0	33	29	0	2	2	0	6	2	3	14	0	14	0	0	49	0	49	14	0	9
Total País	11	8	0	515	453	0	4	4	0	38	15	13	108	0	108	0	0	0	4	0	3	318	0	318	50	0	33

Notif: Casos sospechosos notificados desde la SE 1 a la 43 - 2020.

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI de la SE 1 a la 43 del 2020, notificados por las regiones sanitarias.

Desde la SE 1 a la SE 43 el **país no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, poliomieltis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: desde la SE 1 a la SE 43 se han notificado 515 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 453 han sido descartado para estas dos enfermedades.

Vigilancia de las Parálisis Fláccida Aguda en < de 15 años (PFA) para poliomieltis: Desde la SE 1 a la SE 43 se han notificado 11 casos de PFA de las cuales 8 fueron descartados por laboratorio.

Coqueluche: desde la SE 1 a la SE 43 se han notificado 38 casos sospechosos de las cuales 15 fueron descartados, 13 casos confirmados y 10 quedan pendiente su clasificación final.

Parotiditis: desde la SE 1 a la SE 43 se han notificado 108 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Tétanos en otras edades (TOE): Desde la SE 1 a la SE 43 se han confirmado 3 casos de TOE.

Varicela: desde la SE 1 a la SE 43 se han notificado 318 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): desde la SE 1 a la SE 43 se han reportado 50 casos de ESAVI

Atención: Seguir realizando un control cruzado con la vigilancia de arbovirosis; ya que hemos identificado que han notificado casos con exantema que no ingresaron a la vigilancia de sarampión/rubéola, principalmente aquellos casos que no tienen aún clasificación final de dengue u otra arbovirosis, insistiendo en los distritos silenciosos.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2019 – 2020 SE 43

Tasa ideal de EFE a la SE 43 = 4,05

Tasa ideal de PFA a la SE 43 = 0,81

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA											POLIOMIELITIS								
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		% Muest ileg. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa **		
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Concepción	95	97	85	100	100	100	90	92	70	100	7,96	5,10	95	97	100	1,17	0,00
S. Pedro N	94	94	80	50	100	50	52	0	100	0	7,43	1,96	94	94	100	100	100	0	3,03	1,51
S. Pedro S	97	95	100	83	90	89	89	88	89	100	6,13	7,37	97	95	0,00	0,00
Cordillera	98	100	93	88	93	98	87	98	76	95	18,88	18,95	98	100	100	...	100	...	1,18	0,00
Guairá	97	96	100	100	100	100	93	100	87	100	6,65	5,71	97	96	0,00	0,00
Caaguazú	93	97	53	11	80	97	54	37	61	94	18,29	6,39	93	97	50	0	100	100	1,15	0,58
Caazapá	99	95	87	100	100	100	53	...	73	...	7,91	1,04	99	95	0,00	0,00
Itapúa	99	96	76	83	92	100	80	83	62	92	12,82	1,95	99	95	67	100	100	100	1,60	1,07
Misiones	99	100	75	100	88	83	57	92	71	100	12,65	9,37	99	100	100	...	100	...	2,83	0,00
Paraguarí	99	100	94	91	94	96	91	90	72	98	33,39	34,75	99	100	0,00	0,00
A. Paraná	90	91	79	50	80	63	66	80	59	100	9,15	0,96	90	91	67	100	67	100	1,20	0,40
Central	100	100	66	55	84	86	85	88	78	93	23,58	6,00	100	100	80	100	60	80	0,84	0,83
Ñeembucú	99	100	73	100	85	97	59	60	68	60	28,96	34,34	99	100	...	100	...	100	0,00	4,53
Amambay	100	100	95	100	91	100	78	100	42	100	38,32	18,01	100	100	0,00	0,00
Canindeyú	95	95	68	50	95	50	78	100	78	100	8,24	0,85	95	95	0,00	0,00
Pdte. Hayes	99	99	70	67	90	87	74	69	63	92	15,92	11,72	99	99	0,00	0,00 ^a
Boquerón	97	95	100	75	100	100	33	25	67	100	4,58	5,98	97	95	100	...	100	...	4,95	0,00
A. Paraguay	97	97	50	0	100	100	100	100	50	100	11,18	5,49	97	97	0,00	0,00 ^a
Asunción	99	97	89	85	92	91	90	87	74	93	25,08	6,33	99	96	0,00	0,00
Total País	97	97	75	75	87	92	81	83	70	93	17,76	7,10	97	97	79	91	79	82	0,91	0,52

* Tasa mínima esperada de EFE - 5:100.000 habitantes.

** Tasa mínima esperada de PAF - 1:100.000 < 15 años.

... No corresponde por ausencia de notificación de casos

a Última notif de PFA : Pdte Hayes: 1990; A. Paraguay : 1988

Último caso registrado de Sarampión en 1998, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomielitis en 1985.

Pobl. Gral: 7.252.672 – Pobl. < 15 años: 2.096.380

En la tabla N° 2. Se presentan los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomielitis**; recordando que el mínimo requerido es de 80% por indicador, pero nuestro país se ha propuesto alcanzar el 95% en cada región sanitaria por el riesgo de reintroducción del sarampión/ rubéola.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Actualmente el país cuenta con 1.292 unidades notificadoras. De la SE 1 a la 43 se ha alcanzado un porcentaje acumulado de 97% en este indicador.

Se recuerda a las regiones realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos reportados en la planilla de ENO con el número de casos notificados por notificación individual por ficha epidemiológica.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: La tasa de notificación ideal a la SE 43 debe ser de **4,05** casos de EFE por 100.000 Hts; 14 regiones han alcanzado la tasa esperada para esta semana. Pero la capacidad de respuesta del país dentro de las 48 hs a nivel de los servicios de salud, no se ha cumplido. Tabla 2.

La capacidad de respuesta de las regiones dentro de las 48 Hs, es de suma importancia para controlar un posible brote de sarampión o rubéola, evitando la dispersión en la comunidad y que se restablezca en el país.

Indicadores de Vigilancia de la Poliomielitis: desde la SE 1 a la SE 43 se ha reportado 11 casos de PFA que cuenta con el 91% en el indicador de investigación y 82% en muestra adecuada. No se ha cumplido la tasa de notificación mínima para esta vigilancia, por lo que se solicita intensificar la búsqueda activa de casos de PFA en menores de 15 años.

Las Regiones Sanitarias de Pdte. Hayes y A. Paraguay no reportan casos de PFA hace más de 20 años; por lo que deberían realizar una búsqueda activa retrospectiva de casos. Tabla 2

OBS: Es importante que cada región realice el análisis de sus indicadores, a fin de verificar y comparar la calidad de sus datos; e identificar a tiempo los problemas que dificultan el cumplimiento de los mismos; y realizar intervenciones oportunas que eviten la reintroducción de enfermedades y/o la propagación de las mismas.