



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1 A LA 53 - 2020. (Sujeto a modificación)

REGION SANITARIA	PFA			EFE			DIFTERIA			COQUELUCHÉ			PAROTIDITIS			TNN			TOE			VARICELA			ESAVI		
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	C. Fin
Concepción	0	14	14	0	0	0	3	0	3	0	0	14	0	14	12	0	12
S. Pedro N.	1	1	0	4	1	...	0	0	0	0	0	6	0	6	1	...	1
S. Pedro S.	1	17	16	0	0	0	1	0	1	0	0	18	0	18	1	0	1
Cordillera	1	62	59	0	0	1	0	1	3	0	3	0	1	0	1	8	0	8	1	...	1
Guairá	0	14	14	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0	1	6	...	6
Caaguazú	2	1	0	38	35	0	0	2	1	0	5	1	4	0	0	4	...	4	1	0	1
Caazapá	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Itapúa	3	2	0	16	16	0	0	1	1	...	7	0	7	0	0	37	0	37	5	...	5
Misiones	0	12	11	...	0	2	2	0	0	0	0	7	0	7	1	0	1
Paraguarí	0	92	87	0	0	0	9	0	9	0	0	33	0	33	2	0	2
A. Paraná	2	8	5	0	0	2	1	1	9	0	9	0	1	0	1	11	0	11	0
Central	6	3	0	156	126	0	3	2	0	25	8	9	47	0	43	0	2	...	2	94	0	94	29	0	29
Ñeembucú	1	1	0	36	33	0	0	0	7	0	7	0	0	10	0	10	0
Amambay	0	31	31	0	0	1	1	0	4	0	4	0	0	13	0	13	2	...	2
Canindeyú	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Pdte. Hayes	0	18	15	0	0	1	0	1	8	0	8	0	0	24	0	24	3	...	3
Boquerón	0	4	4	...	0	1	1	0	1	0	1	0	0	4	0	4	1	...	1
A. Paraguay	0	1	1	0	0	0	6	0	6	0	0	9	0	9	4	...	4
Asunción	0	42	41	0	1	1	0	6	2	3	14	0	14	0	0	51	0	51	14	0	14
Total País	17	8	0	569	511	0	4	3	0	42	17	15	126	1	125	0	0	0	4	0	4	345	0	345	83	0	83

Notif: Casos sospechosos notificados desde la SE 1 a la 53 - 2020.

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI de la SE 1 a la 53 del 2020, notificados por las regiones sanitarias.

Desde la SE 1 a la SE 53 el **país no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, poliomiélitis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: desde la SE 1 a la SE 53 se han notificado 569 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 511 han sido descartado para estas dos enfermedades.

Vigilancia de las Parálisis Fláccida Aguda en < de 15 años (PFA) para poliomiélitis: desde la SE 1 a la 53 se han notificado 17 casos sospechosos, de las cuales 8 ya fueron descartado.

Coqueluche: desde la SE 1 a la SE 53 se han notificado 42 casos sospechosos de las cuales 17 fueron descartados, 15 casos confirmados y 10 quedan pendiente su clasificación final.

Parotiditis: desde la SE 1 a la SE 53 se han notificado 126 casos, los cuales 125 fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Tétanos en otras edades (TOE): Desde la SE 1 a la SE 53 se han confirmado 4 casos de TOE.

Varicela: desde la SE 1 a la SE 53 se han notificado 345 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): desde la SE 1 a la SE 53 se han reportado 83 casos de ESAVI todos con clasificación final

Atención: Seguir realizando un control cruzado con la vigilancia de arbovirosis; ya que hemos identificado que han notificado casos con exantema que no ingresaron a la vigilancia de sarampión/rubéola, principalmente aquellos casos que no tienen aún clasificación final de dengue u otra arbovirosis, insistiendo en los distritos silenciosos.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2019 – 2020 SE 53 (Sujeto a modificación)

Tasa ideal de EFE a la SE 53 = 5,00

Tasa ideal de PFA a la SE 53 = 1,00

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA												POLIOMIELITIS							
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		% Muest llog. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec.		Tasa **	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Concepción	94	96	86	100	100	100	90	93	71	93	8,36	5,49	94	96	100	...	0	...	1,17	0,00
S. Pedro N	94	94	77	50	100	50	52	0	100	0	7,43	1,96	94	94	100	100	100	0	3,03	1,51
S. Pedro S	97	96	100	83	90	89	89	88	89	100	7,01	7,37	97	96	100	100	100	100	1,34	1,34
Cordillera	98	100	96	89	96	98	96	98	85	95	28,64	19,92	98	100	100	100	100	0	1,18	1,17
Guairá	97	97	100	100	100	100	100	100	89	100	8,43	6,15	97	97	0,00	0,00
Caaguazú	94	97	58	16	81	97	53	41	61	95	18,65	6,74	94	97	50	50	100	50	1,15	1,15
Caazapá	99	96	82	100	100	100	53	0	71	0	8,97	1,04	99	96	0,00	0,00
Itapúa	98	96	73	94	92	100	82	94	68	100	14,96	2,60	98	96	67	100	100	100	1,60	1,60
Misiones	99	100	83	100	91	83	71	92	81	100	18,18	9,37	99	100	100	...	100	...	2,83	0,00
Paraguarí	99	100	90	91	97	96	92	90	75	98	39,60	35,53	99	100	0,00	0,00
A. Paraná	90	89	82	50	83	63	67	80	63	100	10,01	0,96	90	89	80	100	100	50	2,00	0,80
Central	100	100	69	56	87	87	87	88	80	93	29,79	7,09	100	100	88	100	88	67	1,34	1,00
Ñeembucú	99	100	74	100	87	97	69	71	77	69	41,21	39,87	99	100	...	100	...	100	0,00	4,53
Amambay	100	100	100	100	92	100	79	100	46	100	41,86	18,01	100	100	100	...	100	...	1,90	0,00
Canindeyú	96	95	75	50	95	50	79	100	79	100	8,67	0,85	96	95	0,00	0,00
Pdte. Hayes	99	100	79	67	92	89	83	75	74	94	19,10	14,07	99	100	0,00	0,00 ^a
Boquerón	97	95	100	75	100	100	60	25	80	100	7,63	5,98	97	95	100	...	100	...	4,95	0,00
A. Paraguay	97	98	33	0	100	100	100	100	67	100	16,77	5,49	97	98	0,00	0,00 ^a
Asunción	99	97	90	86	94	90	90	89	77	100	31,97	8,05	99	97	0,00	0,00
Total País	97	97	78	75	90	92	83	85	75	94	21,92	7,85	97	97	85	94	92	65	1,24	0,81

* Tasa mínima esperada de EFE - 5:100.000 habitantes.

** Tasa mínima esperada de PAF - 1:100.000 < 15 años.

... No corresponde por ausencia de notificación de casos

a Última notif de PFA : Pdte Hayes: 1990; A. Paraguay : 1988

Último caso registrado de Sarampión en 1998, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomieltis en 1985.

Pobl. Gral: 7.252.672 – Pobl. < 15 años: 2.096.380

En la tabla N° 2. Se presentan los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomieltis**; recordando que el mínimo requerido es de 80% por indicador, pero nuestro país se ha propuesto alcanzar el 95% en cada región sanitaria por el riesgo de reintroducción del sarampión/ rubéola.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Actualmente el país cuenta con 1.293 unidades notificadoras. De la SE 1 a la 53 se ha alcanzado un porcentaje acumulado de 97% en este indicador.

Se recuerda a las regiones realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos reportados en la planilla de ENO con el número de casos notificados por notificación individual por ficha epidemiológica.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: La tasa de notificación ideal a la SE 53 debe ser de 5 casos de EFE por 100.000 Hts; 14 regiones han alcanzado la tasa esperada para esta semana. Pero la capacidad de respuesta del país dentro de las 48 hs a nivel de los servicios de salud, no se ha cumplido. Tabla 2.

La capacidad de respuesta de las regiones dentro de las 48 Hs, es de suma importancia para controlar un posible brote de sarampión o rubéola, evitando la dispersión en la comunidad y que se restablezca en el país.

Indicadores de Vigilancia de la Poliomieltis: desde la SE 1 a la SE 53 se ha reportado 17 casos de PFA que cuenta con el 94% en el indicador de investigación y 65% en muestra adecuada. No se ha cumplido la tasa de notificación mínima para esta vigilancia, por lo que se solicita intensificar la búsqueda activa de casos de PFA en menores de 15 años.

Las Regiones Sanitarias de Pdte. Hayes y A. Paraguay no reportan casos de PFA hace más de 20 años; por lo que deberían realizar una búsqueda activa retrospectiva de casos. Tabla 2

OBS: Es importante que cada región realice el análisis de sus indicadores, a fin de verificar y comparar la calidad de sus datos; e identificar a tiempo los problemas que dificultan el cumplimiento de los mismos; y realizar intervenciones oportunas que eviten la reintroducción de enfermedades y/o la propagación de las mismas.