



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 - 2020.

REGION SANITARIA	PFA			EFE			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS			TNN			TOE			VARICELA			ESAVI		
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	C. Fin
Concepción	0	0	0	0	0	0	0	0	1	...	1
S. Pedro N.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S. Pedro S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cordillera	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Guairá	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caaguazú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caazapá	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Itapúa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Misiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paraguarí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Paraná	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
Central	0	2	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	0	6	0	6	0
Ñeembucú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amambay	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canindeyú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pdte. Hayes	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Boquerón	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Paraguayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asunción	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Total País	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	3	0	0	0	0	10	0	10	1	0	1

Notif: Casos sospechosos notificados desde la SE 01- 2020.

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI de la SE 1 del 2020, notificados por las regiones sanitarias.

En la semana 01 el **país no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, poliomiélitis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: en la semana 01 se han notificado 5 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales aun ninguno ha sido descartado para estas dos enfermedades, por haberse tomado las muestras de forma temprana y por lo cual se ha solicitado segunda muestra de los mismos para sus respectivos descartes y clasificación final.

Vigilancia de las Parálisis Fláccida Aguda en < de 15 años (PFA) para poliomiélitis: En la SE 01 aun no contamos con la notificación de casos de PFA

Coqueluche: Se ha notificado 1 caso sospechoso correspondiente a la XI RS el cual aun se encuentra pendiente su clasificación por no contar resultado laboratorial.

Parotiditis: En la semana 01 se han notificado 3 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Tétanos en otras edades (TOE): Hasta la fecha sin caso reportado

Varicela: En la semana 01 se han notificado 10 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): En la semana 01 se ha reportado un caso, correspondiente a la I.R.S.

Se pide a las regiones sanitarias: - Verificar las fichas ha ser enviadas, pues la mayoría están incompletas.

- Adjuntar el carnet de vacunación.

- Realizar el seguimiento de los casos graves y enviar la historia clínica y /o la epicrisis.

Atención: Las regiones que han presentado casos de parotiditis y varicela, deben realizar el seguimiento a los contactos a fin de cortar con la cadena de trasmisión, así como también poder identificar oportunamente brotes en la comunidad.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2019 – 2020 SE 01

Tasa ideal de EFE a la SE 53 = 0,1

Tasa ideal de PFA a la SE 53 = 0,02

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA												POLIOMIELITIS							
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		% Muest ileg. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa **	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Concepción	94	93	100	...	100	...	100	...	100	...	0,4	0,00	94	94
S. Pedro N	94	71	0,0	0,00	94	94
S. Pedro S	97	86	0,0	0,00	97	97
Cordillera	98	100	50	100	100	100	100	100	100	100	0,0	0,33	98	98
Guairá	97	85	...	0	...	100	...	100	...	100	0,0	0,44	97	97
Caaguazú	94	91	0,0	0,00	94	94
Caazapá	99	93	0,2	0,00	99	99
Itapúa	98	96	100	...	100	...	100	...	100	...	0,0	0,00	98	98
Misiones	99	99	0,0	0,00	99	99
Paraguarí	99	98	100	...	100	...	100	...	100	...	0,8	0,00	99	99
A. Paraná	90	80	...	0	...	100	...	100	...	100	0,0	0,12	90	90
Central	100	100	31	0	62	100	88	100	50	100	0,6	0,09	100	100
Ñeembucú	99	100	0,0	0,00	99	99
Amambay	100	100	0,0	0,00	100	100
Canindeyú	96	69	0,0	0,00	96	96
Pdte. Hayes	99	100	0	...	100	...	0	...	0	...	0,8	0,00	99	99
Boquerón	97	92	0,0	0,00	97	97
A. Paraguay	97	100	0,0	0,00	97	97
Asunción	99	92	100	...	50	...	100	...	100	...	0,4	0,00	99	99
Total País	97	91	50	20	73	100	88	100	69	100	0,3	0,07	97	97

* Tasa mínima esperada de EFE - 5:100.000 habitantes.

** Tasa mínima esperada de PAF - 1:100.000 < 15 años.

... No corresponde por ausencia de notificación de casos

Último caso registrado de Sarampión en 1998, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomielitis en 1985.

Pobl. Gral: 7.152.703 - Pobl. < 15 años: 2.091.813

En la tabla N° 2. Se presentan los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomielitis**; recordando que el mínimo requerido es de 80% por indicador, pero nuestro país se ha propuesto alcanzar el 95% en cada región sanitaria por el riesgo de reintroducción del sarampión/ rubéola.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Actualmente el país cuenta con 1259 Unidades Notificadoras. En la SE 1 se ha alcanzado un porcentaje de 91 % en este indicador.

Se recuerda a las regiones realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos reportados en la planilla de ENO con el número de casos notificados por notificación individual por ficha epidemiológica.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: La tasa de notificación ideal a la SE 01 debe ser de 0,1 casos de EFE por 100.000 Hts; de las cuatro regiones que han notificado casos solo la XIRS no ha alcanzado la tasa esperada para esta semana. Pero la capacidad de respuesta del país dentro de las 48hs a nivel de los servicios de salud, no se ha cumplido. Tabla 2.

La capacidad de respuesta de las regiones dentro de las 48 Hs, es de suma importancia para controlar un posible brote de sarampión o rubéola, evitando la dispersión en la comunidad y que se restablezca en el país.

Indicadores de Vigilancia de la Poliomielitis: A la semana 1 no se ha reportado casos de PFA.

OBS: Es importante que cada región realice el análisis de sus indicadores, a fin de