



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 04 - 2020.

REGION SANITARIA	PFA			EFE			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS			TNN			TOE			VARICELA			ESAVI		
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	C. Fin
Concepción	0	3	1	0	0	0	0	0	0	2	...	2	1	0	1
S. Pedro N.	0	0	0	0	0	0	0	1	...	1	0
S. Pedro S.	0	2	0	0	0	0	0	1	0
Cordillera	0	16	1	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0
Guairá	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Caaguazú	0	2	0	1	1	...	0	0	0	0	0
Caazapá	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Itapúa	0	2	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0
Misiones	0	0	0	1	1	...	0	0	0	0	0
Paraguarí	0	15	2	0	0	0	3	...	3	0	0	6	0	6	0
A. Paraná	0	1	0	0	0	0	3	0	3	0	0	8	0	8	0
Central	1	16	3	0	0	1	...	0	11	0	11	0	0	19	0	19	0
Ñeembucú	0	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Amambay	0	3	0	1	1	0	1	...	1	0	0	1	...	1	0
Canindeyú	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Pdte. Hayes	0	1	0	0	0	0	0	3	0	3	0
Boquerón	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Paraguay	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asunción	0	11	2	0	0	1	1	...	3	0	3	0	0	13	0	13	1	0	1
Total País	1	0	0	81	12	0	0	0	0	5	4	0	21	0	21	0	0	0	0	69	0	69	2	0	2

Notif: Casos sospechosos notificados desde la SE 04- 2020.

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI de la SE 4 del 2020, notificados por las regiones sanitarias.

Desde la SE 1 a la SE 4 el **país no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, poliomiélitis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: desde la SE 1 a la SE 3 se han notificado 81 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 12 han sido descartado para estas dos enfermedades.

Vigilancia de las Parálisis Flácida Aguda en < de 15 años (PFA) para poliomiélitis: desde la SE 1 a la SE 4 se ha notificado 1 caso sospechoso de PFA correspondiente a la XI RS la misma cuenta con muestra adecuada.

Coqueluche: desde la SE 1 a la SE 4 se han notificado 5 casos sospechosos de las cuales 4 ya fueron descartado y uno queda pendiente.

Parotiditis: desde la SE 1 a la SE 4 se han notificado 21 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Tétanos en otras edades (TOE): Hasta la fecha sin caso reportado.

Varicela: desde la SE 1 a la SE 4 se han notificado 69 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): desde la SE 1 la SE 4 se han reportado 2 casos, correspondiente a la I y XVIII R.S.

Atención: Las regiones que han presentado casos de parotiditis y varicela, deben realizar el seguimiento a los contactos a fin de cortar con la cadena de transmisión, así como también poder identificar oportunamente brotes en la comunidad.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2019 – 2020 SE 04

Tasa ideal de EFE a la SE 04 = 0,4

Tasa ideal de PFA a la SE 04 = 0,07

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA												POLIOMIELITIS							
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		%Muest llog. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa **	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Concepción	93	98	100	100	100	100	100	100	100	100	0,83	1,19	93	94
S. Pedro N	90	65	0	...	100	...	100	...	100	...	0,50	0,00	90	94
S. Pedro S	90	80	...	100	...	100	50	0,00	0,88	90	97
Cordillera	100	100	83	100	83	100	80	25	80	25	1,98	5,21	100	98
Guairá	95	94	...	100	...	100	...	100	...	100	0,00	0,89	95	97
Caaguazú	100	88	100	...	100	...	100	0,00	0,36	100	94
Caazapá	98	76	0	...	50	...	100	...	100	...	1,07	0,00	98	99
Itapúa	96	85	40	100	80	100	60	50	60	50	0,83	0,33	96	98
Misiones	90	100	0,00	0,00	90	99
Paraguarí	100	99	70	60	100	100	90	53	80	53	3,90	5,82	100	99
A. Paraná	86	72	67	0	100	100	67	100	67	100	0,37	0,12	86	90
Central	99	100	38	50	88	100	86	69	79	69	2,27	0,74	99	100	...	100	...	100	...	0,17
Ñeembucú	100	100	...	86	...	100	...	57	...	71	0,00	7,80	100	99
Amambay	100	100	100	100	100	100	100	33	100	33	0,60	1,77	100	100
Canindeyú	84	80	100	...	100	...	0	...	100	...	0,44	0,00	84	96
Pdte. Hayes	95	100	50	...	100	...	75	...	50	...	3,24	0,80	95	99
Boquerón	100	96	0	...	100	...	100	...	0	...	1,56	0,00	100	97
A. Paraguay	100	100	0,00	0,00	100	97
Asunción	99	99	100	82	92	100	73	36	73	45	2,29	2,11	99	99
Total País	95	90	54	75	90	100	82	51	76	55	1,36	1,13	95	97	...	100	...	100	...	0,05

* Tasa mínima esperada de EFE - 5:100.000 habitantes.

** Tasa mínima esperada de PAF - 1:100.000 < 15 años.

... No corresponde por ausencia de notificación de casos

Último caso registrado de Sarampión en 1998, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomieltis en 1985.

Pobl. Gral: 7.152.703 – Pobl. < 15 años: 2.091.813

En la tabla N° 2. Se presentan los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomieltis**; recordando que el mínimo requerido es de 80% por indicador, pero nuestro país se ha propuesto alcanzar el 95% en cada región sanitaria por el riesgo de reintroducción del sarampión/ rubéola.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Actualmente el país cuenta con 1287 Unidades Notificadoras. En la SE 4 se ha alcanzado un porcentaje de 90 % en este indicador.

Se recuerda a las regiones realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos reportados en la planilla de ENO con el número de casos notificados por notificación individual por ficha epidemiológica.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: La tasa de notificación ideal a la SE 04 debe ser de **0,4** casos de EFE por 100.000 Hts; 10/13 de las regiones que han notificado casos han alcanzado la tasa esperada para esta semana. Pero la capacidad de respuesta del país dentro de las 48hs a nivel de los servicios de salud, no se ha cumplido. Tabla 2.

La capacidad de respuesta de las regiones dentro de las 48 Hs, es de suma importancia para controlar un posible brote de sarampión o rubéola, evitando la dispersión en la comunidad y que se restablezca en el país.

Indicadores de Vigilancia de la Poliomieltis: desde la SE 1 a la SE 4 se ha reportado 1 caso de PFA lo cual cuenta con el 100% en los indicadores de investigación y muestra adecuada. Tabla 2

OBS: Es importante que cada región realice el análisis de sus indicadores, a fin de verificar y comparar la calidad de sus datos; e identificar a tiempo los problemas que dificultan el cumplimiento de los mismos; y realizar intervenciones oportunas que eviten la reintroducción de enfermedades y/o la propagación de las mismas.