



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1 A LA 2 - 2021.

REGION SANITARIA	PFA			EFE			DIFTERIA			COQUELUCHÉ			PAROTIDITIS			TNN			TOE			VARICELA			ESAVI		
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	C. Fin
Concepción	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
S. Pedro N.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
S. Pedro S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cordillera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guairá	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caaguazú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caazapá	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Itapúa	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	2	0	2
Misiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paraguarí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Paraná	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Central	0	1	1	0	0	0	3	0	3	0	0	3	0	3	3	0	2
Ñeembucú	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Amambay	0	0	0	0	1	0	1	0	0	5	0	5	0
Canindeyú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pdte. Hayes	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Boquerón	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Paraguay	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asunción	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Total País	0	6	5	0	0	0	4	0	4	0	0	15	0	15	6	0	4

Notif: Casos sospechosos notificados de la SE 1 a la 2 - 2021.

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI de la SE 1 a la 2 del 2021, notificados por las regiones sanitarias.

Desde la SE 1 a la SE 2 el **país no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, poliomiélitis, difteria, tétanos neonatal y tétanos en otras edades

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: desde la SE 1 a la SE 2 se han notificado 6 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 5 han sido descartado para estas dos enfermedades.

Vigilancia de las Parálisis Flácida Aguda en < de 15 años (PFA) para poliomiélitis: no se ha notificado casos

Coqueluche: desde la SE 1 a la SE 2 no se ha notificado casos

Parotiditis: desde la SE 1 a la SE 2 fueron confirmados 4 casos por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Tétanos en otras edades (TOE): no se ha notificado casos

Varicela: desde la SE 1 a la SE 2 se han confirmado 15 casos por clínica. Se han identificado brotes intrafamiliares en las siguientes regiones sanitarias: Itapúa, Central y Amambay

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): desde la SE 1 a la SE 2 se han notificado 4 casos de ESAVI, de los cuales 3 cuentan con clasificación final

Atención: Seguir realizando un control cruzado con la vigilancia de arbovirosis; a fin de identificar casos con exantema que no ingresaron a la vigilancia de sarampión/rubéola, principalmente aquellos casos que no tienen aún clasificación final de dengue u otra arbovirosis, insistiendo en los distritos silenciosos.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO SE 1 A LA 2, 2020 – 2021

Tasa ideal de EFE a la SE 02 =0,19

Tasa ideal de PFA a la SE 2 = 0,04

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA											POLIOMIELITIS								
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		% Muest llog. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec.		Tasa **		
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Concepción	97	93	0	...	100	...	0	...	0	...	0,80	0,00	97	93
S. Pedro N	71	92	0,00	0,00	71	92
S. Pedro S	84	89	0,00	0,00	84	89
Cordillera	100	100	100	...	100	...	100	...	100	...	0,33	0,00	100	100
Guairá	86	99	100	...	100	...	100	...	100	...	0,44	0,00	86	99
Caaguazú	91	92	0,00	0,00	91	92
Caazapá	97	87	0,00	...	97	87
Itapúa	98	91	0	...	100	100	...	0,12	...	98	91
Misiones	99	100	0,00	0,00	99	100
Paraguarí	98	100	0	...	100	...	75	...	75	...	1,55	0,00	98	100
A. Paraná	83	94	0	...	100	...	100	...	100	...	0,12	...	83	94
Central	100	100	33	0	100	100	67	100	67	100	0,42	0,04	100	100	100	...	100	...	0,17	...
Ñeembucú	100	100	50	100	100	100	0	100	0	100	2,23	1,10	100	100
Amambay	100	100	0,00	0,00	100	100
Canindeyú	79	86	0,00	...	79	86
Pdte. Hayes	100	100	...	0	...	100	...	100	...	100	0,00	0,77	100	100 a
Boquerón	94	100	0,00	0,00	94	100
A. Paraguay	100	50	0,00	0,00	100	50 a
Asunción	99	100	50	67	100	67	50	50	...	100	0,77	0,58	99	100
Total País	93	95	32	50	100	83	56	80	56	100	0,35	0,08	93	95	100	...	100	...	0,05	0,00

* Tasa mínima esperada de EFE - 5:100.000 habitantes.

** Tasa mínima esperada de PAF - 1:100.000 < 15 años.

... No corresponde por ausencia de notificación de casos

a Última notif de PFA : Pdte Hayes: 1990; A. Paraguay : 1988

Último caso registrado de Sarampión en 1998, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomielitis en 1985.

Pobl. Gral: 7.252.672 – Pobl. < 15 años: 2.096.380

■ No han cumplido con la tasa mínima de notificación en el 2020, intensificar BAI y BAC

En la tabla N° 2. Se presentan los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomielitis**; recordando que el mínimo requerido es de 80% por indicador, pero nuestro país se ha propuesto alcanzar el 95% en cada región sanitaria por el riesgo de reintroducción del sarampión/ rubéola.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Actualmente el país cuenta con 1316 unidades notificadoras. En la primera semana del año; 5 regiones sanitarias han aumentado sus unidades notificadoras (San Pedro Norte, San Pedro Sur, Caaguazú, Caazapá y Alto Paraná) y el porcentaje acumulado de reporte es del 95%.

Se recuerda a las regiones realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos reportados en la planilla de ENO con el número de casos notificados por notificación individual por ficha epidemiológica.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: La tasa de notificación ideal hasta la SE 2 debe ser de **0,19** casos de EFE por 100.000 Hts; solo 3 regiones han alcanzado la tasa esperada para esta semana. Pero la capacidad de respuesta del país dentro de las 48 hs a nivel de los servicios de salud, no se ha cumplido. Tabla 2.

La capacidad de respuesta de las regiones dentro de las 48 Hs, es de suma importancia para controlar un posible brote de sarampión o rubéola, evitando la dispersión en la comunidad y que se restablezca en el país.

Indicadores de Vigilancia de la Poliomielitis: No se han notificado casos de PFA

Las Regiones Sanitarias de Pdte. Hayes y A. Paraguay no reportan casos de PFA hace más de 20 años; por lo que se sugiere intensificar la búsqueda activa de casos. Tabla 2

OBS: Es importante que cada región realice el análisis de sus indicadores, a fin de verificar y comparar la calidad de sus datos; e identificar a tiempo los problemas que dificultan el cumplimiento de los mismos; y realizar intervenciones oportunas que eviten la reintroducción de enfermedades y/o la propagación de las mismas.