



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1 A LA 38-2021.

REGION SANITARIA	PFA			EFE			DIFTERIA			COQUELUCHÉ			PAROTIDITIS			TNN			TOE			VARICELA			ESAVI	BAI
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	% Reporte
Concepción	1	12	12	0	0	1	1	...	1	0	1	0	0	11	0	11	0	63
S. Pedro N.	0	3	3	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	2	0	0
S. Pedro S.	0	4	4	0	0	0	2	0	2	0	0	3	...	3	0	89
Cordillera	2	18	18	0	0	0	1	0	1	0	0	4	0	4	3	5
Guairá	2	1	...	19	17	0	0	0	4	0	4	0	1	0	1	2	0	2	5	82
Caaguazú	2	1	0	25	25	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Caazapá	1	1	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
Itapúa	1	1	0	13	12	0	1	1	0	3	2	0	7	0	7	0	0	15	0	15	16	8
Misiones	0	5	5	0	0	1	1	0	2	0	2	0	0	3	0	3	0	0
Paraguarí	1	1	0	22	22	0	0	1	1	0	7	...	7	0	0	6	0	6	1	100
A. Paraná	1	1	0	7	6	0	0	5	5	0	0	0	0	3	...	3	2	100
Central	4	2	0	145	136	0	0	39	35	3	35	0	35	0	0	82	0	82	35	100
Ñeembucú	0	22	22	0	0	0	5	0	5	0	0	2	0	2	0	100
Amambay	1	3	3	0	0	5	5	0	5	0	5	0	0	6	0	6	3	0
Canindeyú	0	5	5	0	0	2	2	...	2	...	2	0	0	0	1	0
Pdte. Hayes	1	1	0	63	63	0	0	2	2	0	12	...	12	0	0	7	0	7	2	0
Boquerón	0	4	4	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	3	0	0
A. Paraguay	0	0	0	1	1	0	0	0	0	6	0	6	0	0
Asunción	0	40	39	0	1	1	...	12	11	0	4	0	4	0	0	19	0	19	29	100
Total País	17	9	0	415	401	0	2	2	0	76	70	3	88	0	88	0	1	0	1	176	0	176	98	

Notif: Casos sospechosos notificados desde la SE 1 a la 38 - 2021.

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI de la SE 1 a la 38 del 2021, notificados por las regiones sanitarias.

Desde la SE 1 a la SE 38 el **país no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, poliomiélitis, difteria, tétanos neonatal.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: desde la SE 1 a la SE 38 se han notificado 398 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 415 han sido descartados para estas dos enfermedades.

Vigilancia de las Parálisis Flácida Aguda en < de 15 años (PFA) para poliomiélitis: Desde la SE 1 a la SE 38 se han notificado 15 casos de PFA en menores de 15 años. De los 17 casos, 9 fueron descartados por laboratorio.

Coqueluche: desde la SE 1 a la SE 38 se han notificado 76 casos sospechosos y se han confirmado 3 casos en el Dpto. Central; 1 caso en un lactante de 22 días de vida y dos de 1 mes.

Se descartaron 70 casos por laboratorio; quedan 3 casos pendientes de clasificación.

Parotiditis: desde la SE 1 a la SE 38

fueron confirmados 88 casos por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Tétanos en otras edades (TOE): El primer caso de TOE fue notificado en la SE 18, adulto de sexo masculino de 49 años de edad residente de la IV R.S. sin antecedente vacunal.

Varicela: desde la SE 1 a la SE 38 se han notificado 176 casos de varicela. Se han identificado brotes intrafamiliares en las siguientes regiones sanitarias: Alto Paraguay, Itapúa, Central, Amambay, Boquerón y San Pedro Sur.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): desde la SE 1 a la SE 38 se han notificado 98 casos de ESAVI, todos con clasificación final. No se incluyen ESAVI por vacuna COVID-19

Reporte BAI y BAC: desde la SE 1 a la 38 las regiones que no han reportado sus búsquedas activas institucional y comunitaria son: San Pedro N, Caaguazú, Caazapá, Misiones, Amambay, Canindeyú, Pdte. Hayes, Boquerón y Alto Paraguay

Atención: Seguir realizando un control cruzado con la vigilancia de arbovirosis; a fin de identificar casos con exantema que no ingresaron a la vigilancia de sarampión/rubéola, principalmente aquellos casos que no tienen aún clasificación final de dengue u otra arbovirosis, insistiendo en los distritos silenciosos.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO SE 1 A LA 37, 2020 – 2021

Tasa ideal de EFE a la SE 38 =3,65

Tasa ideal de PFA a la SE 38 = 0,73

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA												POLIOMIELITIS							
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		% Muest llog. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec.		Tasa **	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Concepción	94	94	100	67	100	100	92	83	100	92	5,10	4,64	98	94	...	100	...	100	0,00	1,16
S. Pedro N	93	96	50	100	50	100	0	67	0	100	1,96	1,45	93	96	100	...	0	...	1,51	0,00
S. Pedro S	97	97	83	75	89	75	88	100	100	100	7,37	1,71	94	97	0,00	0,00
Cordillera	97	97	88	89	98	94	98	94	95	94	18,95	5,71	100	97	...	100	...	50	0,00	2,32
Guairá	97	89	100	95	100	89	100	71	100	100	5,71	8,26	96	89	...	100	...	100	0,00	1,56
Caaguazú	92	98	11	40	97	100	37	68	94	100	6,39	4,39	96	98	0	100	100	67	0,58	1,73
Caazapá	100	97	100	60	100	100	...	60	...	100	1,04	2,57	96	97	...	100	...	100	0,00	1,58
Itapúa	98	95	55	77	100	100	82	100	91	100	1,78	2,08	95	95	100	100	100	100	1,07	0,53
Misiones	99	100	100	80	82	80	91	40	100	100	8,59	3,85	100	100	0,00	0,00
Paraguarí	100	100	91	91	96	100	90	91	98	100	34,75	8,45	100	100	...	100	...	100	0,00	1,46
A. Paraná	88	93	43	86	57	86	75	29	100	100	0,84	0,83	91	93	...	100	...	100	0,00	0,40
Central	100	99	54	68	87	94	89	71	94	91	5,45	6,46	100	99	100	100	50	100	0,67	0,66
Ñeembucú	99	100	100	91	96	100	56	91	56	100	31,01	24,24	100	100	100	...	100	...	4,53	0,00
Amambay	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	18,01	1,72	100	100	...	100	...	100	0,00	1,89
Canindeyú	94	98	50	80	50	100	100	80	100	100	0,85	2,09	94	98	0,00	0,00
Pdte. Hayes	99	100	55	68	82	97	56	78	89	86	8,60	48,37	99	100	...	100	...	100	0,00 ^a	2,45
Boquerón	98	98	75	100	100	100	25	79	100	100	5,98	5,88	95	98	0,00	0,00
A. Paraguay	97	97	0	...	100	...	100	...	100	...	5,49	0,00	97	97	0,00 ^a	0,00
Asunción	99	98	84	98	91	93	86	84	93	97	6,14	7,68	96	98	0,00	0,00
Total País	97	97	74	75	92	95	83	77	93	94	6,78	5,64	97	97	89	100	67	88	0,43	0,81

* Tasa mínima esperada de EFE - 5:100.000 habitantes.

** Tasa mínima esperada de PAF - 1:100.000 < 15 años.

... No corresponde por ausencia de notificación de casos

Último caso registrado de Sarampión en 1998, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomieltis en 1985.

Pobl. Gral: 7.353.038 - Pobl. < 15 años: 2.101.026

En la tabla N° 2. Se presentan los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomieltis**; recordando que el mínimo requerido es de 80% por indicador, pero nuestro país se ha propuesto alcanzar el 95% en cada región sanitaria por el riesgo de reintroducción del sarampión/ rubéola.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Actualmente el país cuenta con 1347 unidades notificadoras y el porcentaje acumulado de reporte semanal hasta la SE 38 es del 97%.

Se recuerda a las regiones realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos reportados en la planilla de ENO con el número de casos notificados por notificación individual por ficha epidemiológica.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola (Vigilancia de las EFE): La tasa de notificación ideal hasta la SE 38 debe ser de **3,65**. En la semana 38 el país cumple con la tasa mínima de casos de EFE por 100.000 Hts; sigue silenciosa 1 región sanitaria; y 7 regiones no cumplieron con la tasa mínima de notificación. Tabla 2.

Las regiones de frontera: **Itapúa, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú**; no han cumplido con la tasa mínima de notificación lo que representa una baja sensibilidad para captar casos sospechosos de sarampión y rubéola; **esta situación amerita intensificar la búsqueda activa de casos, institucional y en la base de arbovirosis captando todos aquellos casos que presentaron exantema y hayan tenido resultado negativo; se debe completar ficha de EFE, realizar intervención comunitaria y solicitar al LCSP para que procese sarampión y rubéola (tomar muestra de sangre si están aún dentro de los 30 días de inicio de la erupción, y no cuentan con muestra remitida para arbovirosis en el LCSP).** Tabla 2.

La capacidad de respuesta de las regiones dentro de las 48 Hs, es de suma importancia para controlar un posible brote de sarampión o rubéola, evitando la dispersión en la comunidad y que se restablezca en el país.

Indicadores de Vigilancia de la Poliomieltis (Vigilancia de las PFA en menores de 15 años): La tasa de notificación ideal hasta la SE 38 debe ser de 0,73; el país ha cumplido con la tasa esperada. El cumplimiento del indicador de investigación es del 100% y el de muestra adecuada 88%. Ingreso al sistema dos caso correspondiente a III y V región sanitaria, ambos casos la muestra se tomo tardíamente la razón del mismo fue porque ambos ya fueron captados tardíamente en los hospitales de referencia. Con relación de la intervención dentro de las 48hs se encuentra al 100%; La Región Sanitaria de A. Paraguay no ha reportado casos de PFA hace más de 20 años; por lo que se sugiere intensificar la búsqueda activa de casos. Tabla 2