



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1 A LA 47-2021.

REGION SANITARIA	PFA			EFE			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS			TNN			TOE			VARICELA			ESAVI	BAI
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	% Repor te
Concepción	1	1	...	16	16	0	0	1	1	...	2	0	2	0	0	13	0	13	0	57
S. Pedro N.	3	1	...	2	2	0	0	1	1	0	3	0	3	0	0	3	0	3	0	0
S. Pedro S.	0	7	7	0	0	0	2	0	2	0	0	4	...	4	0	87
Cordillera	2	2	...	23	23	0	0	1	1	...	2	0	2	0	0	6	0	6	3	23
Guairá	1	1	...	24	24	0	0	0	5	0	5	0	2	0	2	2	0	2	5	85
Caaguazú	3	3	0	33	32	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	1	0	17
Caazapá	1	1	0	12	12	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
Itapúa	2	1	0	18	18	0	1	1	0	4	3	0	11	0	11	0	0	24	0	24	18	26
Misiones	0	5	5	0	0	2	2	0	2	0	2	0	0	6	0	6	0	0
Paraguarí	1	1	0	27	27	0	0	1	1	0	7	...	7	0	0	30	0	30	2	100
A. Paraná	3	2	0	9	9	0	0	5	5	0	1	0	1	0	0	4	...	4	2	100
Central	5	4	0	192	187	0	2	2	...	43	41	3	48	1	47	0	0	118	0	118	46	100
Ñeembucú	0	25	25	0	0	2	0	...	5	0	5	0	0	3	0	3	2	100
Amambay	1	1	...	5	5	0	0	5	5	0	5	0	5	0	0	8	0	8	3	0
Canindeyú	0	7	6	0	0	2	2	...	2	...	2	0	0	0	1	0
Pdte. Hayes	1	1	0	68	68	0	0	2	2	0	11	...	11	0	0	12	0	12	3	11
Boquerón	0	4	4	0	0	1	1	0	0	...	0	0	3	0	3	1	0	
A. Paraguay	0	0	0	1	1	0	1	...	1	0	0	6	0	6	1	0
Asunción	0	53	52	0	2	1	...	14	13	1	12	0	12	0	0	37	0	37	35	100
Total País	24	19	0	530	522	0	5	4	0	87	81	4	119	1	118	0	2	0	2	281	0	281	124	

Notif: Casos sospechosos notificados desde la SE 1 a la 47 - 2021.

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI de la SE 1 a la 47 del 2021, notificados por las regiones sanitarias.

Desde la SE 1 a la SE 47 el **país no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, poliomielitis, difteria, tétanos neonatal.

Vigilancia de las Enfermedades Febris Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: desde la SE 1 a la SE 47 se han notificado 530 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 522 han sido descartados para estas dos enfermedades.

Vigilancia de las Parálisis Fláccida Aguda en < de 15 años (PFA) para poliomielitis: Desde la SE 1 a la SE 47 se han notificado 24 casos de PFA en menores de 15 años; de los cuales 19 fueron descartados por laboratorio.

Coqueluche: desde la SE 1 a la SE 47 se han notificado 87 casos sospechosos y se han confirmado 4 casos: 3 en el Dpto. Central; y 1 caso en Asunción. Se descartaron 81 casos por laboratorio; quedan 4 casos pendientes de clasificación, y 1 caso probable por clínica en la Región de Itapúa

Parotiditis: desde la SE 1 a la SE 47 fueron confirmados 118 casos por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Tétanos en otras edades (TOE): Hasta la SE 47 se han confirmado 2 casos de TOE; con residencia en el distrito de Villarrica – IV R.S que vuelve a ser un distrito repetidor.

Varicela: desde la SE 1 a la SE 47 se han notificado 281 casos de varicela. Se han identificado brotes intrafamiliares en las siguientes regiones sanitarias: Alto Paraguay, Itapúa, Central, Amambay, Boquerón, San Pedro Sur y Paraguarí.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): desde la SE 1 a la SE 47 se han notificado 124 casos de ESVI, todos con clasificación final. No se incluyen ESVI por vacuna COVID-19.

Reporte BAI y BAC: desde la SE 1 a la 47 las regiones que no han reportado sus búsquedas activas institucional y comunitaria son: San Pedro N, Caazapá, Misiones, Amambay, Canindeyú, Boquerón y Alto Paraguay.

**Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO SE 1 A LA 47, 2020 – 2021**

Tasa ideal de EFE a la SE 47 =4,51

Tasa ideal de PFA a la SE 47 = 0,90

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA												POLIOMIELITIS							
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adep		% Muest Ileg. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa **	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Concepción	97	94	100	64	100	100	92	88	100	94	5,10	6,19	97	94	...	100	...	100	0,00	1,16
S. Pedro N	94	94	50	100	50	100	0	50	0	100	1,96	0,97	94	94	100	100	0	0	1,51	3,02
S. Pedro S	95	97	83	86	89	83	88	100	100	100	7,37	3,00	95	97	100	...	100	...	1,34	0,00
Cordillera	100	98	89	91	98	96	98	95	95	91	19,92	7,30	100	98	100	100	0	50	1,17	2,32
Guairá	97	91	100	100	100	96	100	73	100	100	6,15	10,43	97	91	...	100	...	100	0,00	1,56
Caaguazú	97	98	16	33	97	100	38	67	92	97	6,74	5,79	97	98	0	100	100	75	0,58	2,30
Caazapá	96	98	100	83	100	100	...	83	...	100	1,04	6,17	96	98	...	100	...	100	0,00	1,58
Itapúa	96	96	93	78	100	100	93	100	100	100	2,27	2,88	96	96	100	100	100	100	1,60	1,07
Misiones	100	100	100	80	83	80	92	40	100	80	9,37	3,85	100	100	0,00	0,00
Paraguarí	100	100	91	93	96	100	90	93	98	100	35,53	10,37	100	100	...	100	...	100	0,00	1,46
A. Paraná	91	90	50	78	63	89	80	56	100	100	0,96	1,07	91	90	100	100	100	100	0,40	1,21
Central	100	95	55	65	86	95	87	77	93	94	6,45	8,56	100	95	100	80	67	100	1,00	0,83
Ñeembucú	100	100	100	92	97	100	70	92	70	100	37,66	27,54	100	100	100	...	100	...	4,53	0,00
Amambay	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	18,01	2,86	100	100	...	100	...	100	0,00	1,89
Canindeyú	96	98	50	86	50	86	100	83	100	100	0,85	2,92	96	98	0,00	0,00
Pdte. Hayes	100	100	67	69	87	97	77	81	100	88	11,72	52,20	100	100	...	100	...	100	0,00 ^a	2,45
Boquerón	95	99	75	100	100	100	25	75	100	100	5,98	5,88	95	99	0,00	0,00
A. Paraguay	98	98	0	...	100	...	100	...	100	...	5,49	0,00	98	98	0,00 ^a	0,00
Asunción	97	98	86	96	89	94	91	88	100	100	7,09	10,17	97	98	0,00	0,00
Total País	97	97	75	75	92	96	84	81	94	95	7,47	7,21	97	97	93	96	73	83	0,72	1,14

* Tasa mínima esperada de EFE - 5:100.000 habitantes.

Último caso registrado de Sarampión en 1998, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

** Tasa mínima esperada de PAF - 1:100.000 < 15 años.

Último caso registrado de Poliomielitis en 1985.

... No corresponde por ausencia de notificación de casos

Pobl. Gral: 7.353.038 — Pobl. < 15 años: 2.101.026

En la tabla N° 2. Se presentan los indicadores de vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomielitis; recordando que el mínimo requerido es de 80% por indicador, pero nuestro país se ha propuesto alcanzar el 95% en cada región sanitaria por el riesgo de reintroducción del sarampión/ rubéola.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Actualmente el país cuenta con 1362 unidades notificadoras y el porcentaje acumulado de reporte semanal hasta la SE 47 es del 97%.

Se recuerda a las regiones realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos reportados en la planilla de ENO con el número de casos notificados por notificación individual por ficha epidemiológica.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola (Vigilancia de las EFE): La tasa de notificación ideal hasta la SE 47 debe ser de 4,51. En la semana 47 el país cumple con la tasa mínima de casos de EFE por 100.000 Hts; sigue silenciosa 1 región sanitaria; y 7 regiones no cumplieron con la tasa mínima de notificación. Tabla 2.

Las regiones de frontera: Itapúa, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú; no han cumplido con la tasa mínima de notificación lo que representa una baja sensibilidad para captar casos sospechosos de sarampión y rubéola; esta situación amerita intensificar la búsqueda activa de casos, institucional y en la base de arbovirosis captando todos aquellos casos que presentaron exantema y hayan tenido resultado negativo; se debe completar ficha de EFE, realizar intervención comunitaria y solicitar al LCSP para que procese sarampión y rubéola (tomar muestra de sangre si están aún dentro de los 30 días de inicio de la erupción, y no cuentan con muestra remitida para arbovirosis en el LCSP). Tabla 2.

La capacidad de respuesta de las regiones dentro de las 48 Hs, es de suma importancia para controlar un posible brote de sarampión o rubéola, evitando la dispersión en la comunidad y que se restablezca en el país.

Indicadores de Vigilancia de la Poliomielitis (Vigilancia de las PFA en menores de 15 años): La tasa de notificación ideal hasta la SE 47 debe ser de 0,90; el país ya ha cumplido con la tasa esperada anual. El cumplimiento del indicador de investigación es del 96% y el de muestra adecuada 83%.

La Región Sanitaria de A. Paraguay no ha reportado casos de PFA hace más de 20 años; por lo que se sugiere intensificar la búsqueda activa de casos. Tabla 2