



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 6 - 2023.

REGION SANITARIA	PFA			EFE			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS			TNN			TOE			VARICELA			ESAVI	BAI
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	% Reporte
Concepción	0	4	1	...	0	...	0	0	0	0	0	2	...	1	0	100
S. Pedro N.	0	1	0	...	0	0	0	0	0	1	...	1	1	67
S. Pedro S.	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	...	0	0	100
Cordillera	0	9	1	...	0	...	0	0	1	...	1	0	0	4	...	1	0	100
Guairá	0	3	3	...	0	...	0	0	0	0	0	1	...	1	1	83
Caaguazú	0	1	1	...	0	...	0	0	0	0	0	2	...	2	0	100
Caazapá	0	2	1	...	0	...	0	0	1	...	1	0	0	1	...	0	0	100
Itapúa	0	57	9	...	0	...	0	0	1	0	1	0	0	11	...	9	0	100
Misiones	0	1	0	...	0	0	0	0	0	0	...	0	0	100
Paraguarí	0	85	11	...	0	...	0	0	0	0	0	4	...	4	0	100
A. Paraná	0	3	0	...	0	1	1	0	0	0	0	3	...	1	0	100
Central	2	195	11	...	0	...	0	0	3	0	3	0	1	...	1	19	...	15	3	100
Ñeembucú	0	7	0	...	0	0	2	0	2	0	0	0	...	0	0	100
Amambay	0	2	0	...	0	0	0	0	0	0	...	0	0	100
Canindeyú	0	1	1	...	0	...	0	0	1	0	1	0	0	0	...	0	0	100
Pdte. Hayes	0	3	0	...	0	1	0	0	0	3	...	3	0	100
Boquerón	0	0	0	...	0	0	0	0	0	4	...	4	0	100
A. Paraguay	0	0	0	...	0	0	0	0	0	1	...	1	2	50
Asunción	0	19	3	...	1	...	0	0	4	0	4	0	0	7	...	4	2	100
Total País	2	393	42	0	1	1	0	2	1	0	13	...	13	0	1	...	1	63	...	63	9	

Notif: Casos sospechosos notificados de la SE 6 - 2023.

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI de la SE 6 del 2023, notificados por las regiones sanitarias.

En la SE 6 el país **no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, poliomielitis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: hasta la SE 6 se ha notificado 393 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 42 casos han sido descartados para estas dos enfermedades.

Vigilancia de las Parálisis Flácida Aguda en < de 15 años (PFA) para poliomielitis: hasta la SE 6 se ha notificado 2 caso sospechoso de PFA, ambos con investigación y muestra adecuada.

Difteria:

Coqueluche: hasta la SE 6 se ha notificado 2 caso sospechosos de los cuales 1 caso se encuentra ya descartado por laboratorio y 1 caso pendiente de resultado laboratorial.

Parotiditis: hasta la SE 6 se han notificado 13 casos confirmados por clínica.

Tétanos en otras edades (TOE): En la SE 1 se notificó un caso sospechoso de TOE el mismo de sexo masculino, de 63 años de profesión artesano del departamento de central distrito San Lorenzo. El mismo no cuenta con antecedentes de dosis de vacuna Td. Se encuentra internado en UCIA del IMT.

Varicela: hasta la SE 6 se ha notificado 63 casos correspondientes a las regiones de Cordillera, Caaguazú, Itapúa, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Capital, Pdte. Hayes y Boquerón.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): hasta la SE 6 se notificaron 9 casos de ESAVI. No se incluyen ESAVI por vacuna COVID-19.

Reporte BAI y BAC: En la SE 6 las 18 regiones sanitarias han reportado sus búsquedas activas institucionales.

Atención: Seguir realizando un control cruzado con la vigilancia de arbovirosis; a fin de identificados casos con exantema que no ingresaron a la vigilancia de sarampión/rubéola, principalmente aquellos casos que no tienen aún clasificación final de dengue u otra arbovirosis, insistiendo en los distritos silenciosos.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2021 – 2022 SE 6

Tasa ideal de EFE a la SE 06 =0,57

Tasa ideal de PFA a la SE 6 = 0,11

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA												POLIOMIELITIS							
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		%Muest llog. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa **	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Concepción	89	97	...	50	...	50	...	50	...	100	0,00	1,52	84	97
S. Pedro N	90	92	0,00	0,48	85	88
S. Pedro S	97	93	0,00	...	99	94
Cordillera	100	100	100	22	100	44	100	100	100	100	0,94	2,82	100	100
Guairá	98	99	100	67	86	100	83	100	100	100	3,01	1,29	100	99
Caaguazú	79	96	50	100	100	100	50	100	83	100	1,04	0,17	88	96
Caazapá	88	92	100	50	100	100	0	100	67	100	1,52	1,02	88	89
Itapúa	94	100	80	23	100	54	60	87	60	97	0,79	8,99	94	100
Misiones	100	99	0,00	0,76	100	99
Paraguarí	99	100	67	16	67	29	100	80	100	100	1,15	32,48	100	100
A. Paraná	98	97	0	...	100	100	0	33	0	100	0,12	0,35	97	98
Central	100	100	56	23	100	24	67	100	100	98	0,39	8,53	100	100	...	100	...	100	...	0,33
Ñeembucú	100	100	75	...	100	86	75	67	75	100	4,38	7,67	100	100
Amambay	100	100	0	50	100	100	100	...	100	100	0,56	1,13	100	100
Canindeyú	91	92	100	100	100	100	0	100	100	100	0,82	0,41	86	88
Pdte. Hayes	98	99	67	33	100	33	83	100	100	100	4,53	2,26	98	95
Boquerón	100	97	0,00	...	100	100
A. Paraguay	100	100	0,00	...	0	100
Asunción	99	96	83	37	100	53	83	100	83	100	1,15	3,65	96	95
Total País	95	97	73	23	96	35	67	88	87	99	0,75	5,27	95	97	...	100	...	100	...	0,09

* Tasa mínima esperada de EFE - 5:100.000 habitantes.

** Tasa mínima esperada de PAF - 1:100.000 < 15 años.

... No corresponde por ausencia de notificación de casos

Último caso registrado de Sarampión en 1998, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomielitis en 1985.

a Última notif de PFA : Pdte Hayes: 2021; A. Paraguay: 1988

En la tabla N° 2. Se presentan los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomielitis**; recordando que el mínimo requerido es de 80% por indicador, pero nuestro país se ha propuesto alcanzar el 95% en cada región sanitaria por el riesgo de reintroducción del sarampión/ rubéola.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: A partir de la SE N° 6 el país cuenta con 1434 unidades notificadora; con un cumplimiento acumulado del 97%. En la SE N° 6 han notificado el 97% de las unidades notificadoras.

Se recuerda a las regiones realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos reportados en la planilla de ENO con el número de casos notificados por notificación individual por ficha epidemiológica.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: la tasa de notificación ideal hasta la SE N° 5 es de 0,57 casos de EFE por 100.000 Hts. Hasta la SE N° 6 el país solo se cumple con el indicador de tasa de notificación

La investigación adecuada realizada dentro de las 48 hs de notificado el caso sospechoso, es de suma importancia para evitar casos secundarios en la comunidad de confirmarse el caso como sarampión o rubéola. Es por eso que debe realizarse ante la sospecha, sin esperar el resultado de laboratorio

Indicadores de Vigilancia de la Poliomielitis: la tasa de notificación ideal hasta la SE N° 6 es de 0,11 por 100.000 menores de 15 años; el país ha alcanzado la tasa ideal; se cumple con los indicadores de: investigación <= 48h y muestra adecuada. Tabla N°2

OBS: Es importante que cada región realice el análisis de sus indicadores, a fin de verificar y comparar la calidad de sus datos; e identificar a tiempo los problemas que dificultan el cumplimiento de los mismos; y realizar intervenciones oportunas que eviten la reintroducción de enfermedades y/o la propagación de las mismas.