



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 7 - 2023.

REGION SANITARIA	PFA			EFE**			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS			TNN			TOE			VARICELA			ESAVI	BAI
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	% Reporte
Concepción	0	4	1	0	0	...	0	0	...	0	0	0	2	...	1	0	100	
S. Pedro N.	0	1	1	0	0	...	0	0	...	0	0	0	2	...	2	1	100	
S. Pedro S.	0	0	0	...	0	0	...	0	0	0	0	...	0	0	100	
Cordillera	0	9	1	0	0	...	0	0	...	1	...	1	0	0	5	...	5	0	100	
Guairá	0	3	3	0	0	...	0	0	...	0	0	0	1	...	1	1	71	
Caaguazú	0	2	1	0	0	...	0	0	...	0	0	0	2	...	2	0	100	
Caazapá	0	2	1	0	0	...	0	0	...	1	...	1	0	0	1	...	1	0	100	
Itapúa	0	61	13	0	0	...	0	0	...	1	0	1	0	0	12	...	12	0	100	
Misiones	0	1	1	0	0	...	0	0	...	0	0	0	0	...	0	0	100	
Paraguarí	0	126	11	0	0	...	0	0	...	1	...	1	0	0	5	...	5	0	100	
A. Paraná	0	4	0	...	0	1	1	0	0	0	0	3	...	3	0	100
Central	2	233	12	0	0	...	0	0	...	3	0	3	0	1	...	1	24	...	24	3	100	
Ñeembucú	0	10	...	0	0	...	0	0	...	2	0	2	0	0	0	...	0	0	100	
Amambay	0	2	...	0	0	...	0	0	...	0	0	0	0	...	0	0	100	
Canindeyú	0	2	1	0	0	...	0	0	...	1	0	1	0	0	0	...	0	0	100	
Pdte. Hayes	0	3	...	0	0	...	0	1	1	...	0	0	0	4	...	4	0	100
Boquerón	0	0	0	...	0	0	...	0	0	0	4	...	4	0	100	
A. Paraguay	0	0	0	...	0	0	...	0	0	0	1	...	1	2	43	
Asunción	0	21	3	0	1	1	0	0	...	5	0	5	0	0	9	...	9	2	100	
Total, País	2	484	49	0	1	1	0	2	2	0	15	...	15	0	1	...	1	75	...	75	9	

Notif: Casos sospechosos notificados de la SE 7 - 2023. ****** Datos parciales hasta SE 7

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI de la SE 1 a la 7 del 2023, notificados por las regiones sanitarias.

Hasta la SE 7 el país **no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, poliomielitis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: hasta la SE 7 se ha notificado 484 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 49 casos han sido descartados para estas dos enfermedades.

Vigilancia de las Parálisis Flácida Aguda en < de 15 años (PFA) para poliomielitis: hasta la SE 7 se ha notificado 2 caso sospechoso de PFA, ambos con investigación y muestra adecuada.

Difteria: hasta la SE 7 se ha notificado 1 caso ya descartado por laboratorio.

Coqueluche: hasta la SE 7 se ha notificado 2 caso ya descartado por laboratorio.

Parotiditis: hasta la SE 7 se han notificado 15 casos confirmados por clínica.

Tétanos en otras edades (TOE): En la SE 1 se notificó un caso sospechoso de TOE el mismo de sexo masculino, de 63 años de profesión artesano del departamento de central distrito San lorenzo. El mismo no cuenta con antecedentes de dosis de vacuna Td. Se encuentra internado en UCIA del IMT.

Varicela: hasta la SE 7 se ha notificado 75 casos correspondientes a las regiones de Cordillera, Caaguazú, Itapúa, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Capital, Pdte. Hayes y Boquerón.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): hasta la SE 7 se notificaron 9 casos de ESAVI. No se incluyen ESAVI por vacuna COVID-19.

Reporte BAI y BAC: En la SE 7 las 16 regiones sanitarias han reportado sus búsquedas activas institucionales. No reportaron los departamentos de Guaira y Alto Paraguay.

Atención: Seguir realizando un control cruzado con la vigilancia de arbovirosis; a fin de identificados casos con exantema que no ingresaron a la vigilancia de sarampión/rubéola, principalmente aquellos casos que no tienen aún clasificación final de dengue u otra arbovirosis, insistiendo en los distritos silenciosos.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2021 – 2022 SE 7

Tasa ideal de EFE a la SE 07 =0,66

Tasa ideal de PFA a la SE 07 = 0,13

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA											POLIOMIELITIS									
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		%Muest llog. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa **			
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Concepción	89	97	50	50	100	75	...	67	50	100	1,00	1,52	89	97	
S. Pedro N	90	92	...	0	...	100	...	100	...	100	0,00	0,48	90	88	
S. Pedro S	97	93	0,00	...	97	94	
Cordillera	100	100	100	22	100	44	100	100	100	100	0,27	2,82	100	100	
Guairá	99	99	100	67	100	100	86	100	100	100	0,00	1,29	99	99	
Caaguazú	79	96	83	100	100	100	67	100	100	100	0,00	0,35	79	96	
Caazapá	89	92	100	50	100	100	33	100	100	100	1,03	1,02	89	89	
Itapúa	93	100	80	23	100	84	100	87	100	97	0,00	9,62	95	100	
Misiones	100	99	...	0	...	100	...	100	...	100	0,00	0,76	100	99	
Paraguarí	100	100	100	16	100	53	100	80	100	70	1,77	48,15	100	100	
A. Paraná	98	97	0	75	0	33	0	100	0,00	0,47	97	98	100	...	100	...	0,40	...	
Central	100	100	71	23	93	24	69	96	100	94	0,58	10,19	100	100	100	100	100	100	0,33	0,33	
Ñeembucú	100	100	75	0	100	86	75	67	75	100	5,51	10,96	100	100	
Amambay	100	100	0	50	100	100	100	100	100	100	0,00	1,13	100	100	
Canindeyú	91	92	100	50	100	50	0	100	100	100	3,84	0,82	91	88	
Pdte. Hayes	98	99	67	33	100	33	83	100	100	100	4,53	2,26	98	95	
Boquerón	100	97	0,00	...	100	100	100	...	100	...	4,79	...	
A. Paraguay	100	100	0,00	...	100	100	
Asunción	99	96	86	33	100	57	86	100	100	92	1,15	4,03	99	95	100	...	0,82	...	
Total País	96	97	80	23	97	44	76	78	87	99	0,54	6,49	96	97	80	100	100	100	100	0,24	0,09

* Tasa mínima esperada de EFE - 5:100.000 habitantes.

** Tasa mínima esperada de PAF - 1:100.000 < 15 años.

... No corresponde por ausencia de notificación de casos

Último caso registrado de Sarampión SE 37 del 2022, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomielitis en 1985.

En la tabla N° 2. Se presentan los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomielitis**; recordando que el mínimo requerido es de 80% por indicador, pero nuestro país se ha propuesto alcanzar el 95% en cada región sanitaria por el riesgo de reintroducción del sarampión/ rubéola.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: A partir de la SE N° 7 el país cuenta con 1434 unidades notificadora; con un cumplimiento acumulado del 97%. En la SE N° 7 han notificado el 97% de las unidades notificadoras.

Se recuerda a las regiones realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos reportados en la planilla de ENO con el número de casos notificados por notificación individual por ficha epidemiológica.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: la tasa de notificación ideal hasta la SE N° 7 es de 0,66 casos de EFE por 100.000 Hts. Hasta la SE N° 7 el país solo se cumple con el indicador de tasa de notificación

La investigación adecuada realizada dentro de las 48 hs de notificado el caso sospechoso, es de suma importancia para evitar casos secundarios en la comunidad de confirmarse el caso como sarampión o rubéola. Es por eso que debe realizarse ante la sospecha, sin esperar el resultado de laboratorio

Indicadores de Vigilancia de la Poliomielitis: la tasa de notificación ideal hasta la SE N° 7 es de 0,13 por 100.000 menores de 15 años; el país ha alcanzado la tasa ideal; se cumple con los indicadores de: investigación <= 48h y muestra adecuada. Tabla N°2

OBS: Es importante que cada región realice el análisis de sus indicadores, a fin de verificar y comparar la calidad de sus datos; e identificar a tiempo los problemas que dificultan el cumplimiento de los mismos; y realizar intervenciones oportunas que eviten la reintroducción de enfermedades y/o la propagación de las mismas.