



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1 AL 3- 2024

REGION SANITARIA	PFA			EFE**			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS			TNN			TOE			VARICELA			ESAVI	BAI
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Reporte
Concepción	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100
S. Pedro N.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100
S. Pedro S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100
Cordillera	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Guairá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Caaguazú	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100
Caazapá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100
Itapúa	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	100
Misiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Paraguarí	0	0	0	9	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	100
A. Paraná	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100
Central	2	0	0	37	10	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	14	0	14	1	100
Ñeembucú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100
Amambay	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100
Canindeyú	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100
Pdte. Hayes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	100
Boquerón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
A. Paraguay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100
Asunción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	100
Total, País	3	0	0	59	19	0	0	0	2	1	0	14	0	14	0	0	0	0	0	0	54	0	54	1	83	

Notif: Casos sospechosos notificados de la SE 1 al 3 del 2024.

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI a la SE 3 del 2024, notificados por las Regiones Sanitarias.

Hasta la SE 03 el país **no se han confirmado ningún caso de**: sarampión, rubéola, poliomielitis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Parálisis Flácida Aguda en < de 15 años (PFA) para poliomielitis: hasta la SE 03 se ha notificado tres casos sospechosos de PFA, se encuentran pendiente el resultado de laboratorio.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: hasta la SE 03 se han notificado 59 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 19 fueron descartados.

Difteria: Aun no se ha notificado ningún caso sospechoso.

Coqueluche: hasta la SE 03 se han notificado 2 casos sospechosos de los cuales un caso fue descartado y el otro caso pendiente resultado de laboratorio

Parotiditis: hasta la SE 03 se han notificado 14 casos confirmados por clínica.

Tétanos Neonatal (TNN): Aun no se ha notificado ningún caso sospechoso

Tétanos en Otras Edades (TOE): Aun no se ha notificado ningún caso sospechoso

Varicela: hasta la SE 03 se ha notificado 54 casos confirmados por clínica.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): Aun no se ha notificado ninguno.

Reporte Búsqueda Activa Institucional (BAI): A la SE 03 las 18 Regiones Sanitarias han reportado sus BAI.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2023 – 2024 SE 1 AL 3

Tasa ideal de EFE a la SE 3= 0,28

Tasa ideal de PFA a la SE 3= 0,06

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA												POLIOMIELITIS							
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		% Muest lleg. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa*		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa**	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Concepción	93	93	0	50	0	100	0	100	0	100	0,00	0,74	93	93	0	0	0	0	0,00	0,00
S. Pedro N	88	88	0	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,47	88	88	0	0	0	0	0,00	0,00
S. Pedro S	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	94	94	0	0	0	0	0,00	0,00
Cordillera	100	100	33	0	100	100	67	100	100	100	0,31	0,31	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00
Guairá	99	99	50	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0,00	99	99	0	0	0	0	0,00	0,00
Caaguazú	93	93	0	0	0	100	0	0	0	0	0,17	0,17	93	93	0	0	0	0	0,00	0,00
Caazapá	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	86	86	0	0	0	0	0,00	0,00
Itapúa	100	100	50	100	100	100	50	100	0	100	0,00	0,15	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00
Misiones	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	99	99	0	0	0	0	0,00	0,00
Paraguarí	100	100	67	56	33	78	0	78	100	100	0,38	3,40	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00
A. Paraná	97	97	0	100	0	100	0	0	0	0	0,12	0,11	97	97	0	100	0	0	0,00	0,40
Central	100	100	55	54	71	78	50	81	100	100	0,09	1,56	100	100	100	50	0	50	0,16	0,32
Ñeembucú	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,10	0,00	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00
Amambay	100	100	0	100	0	60	0	0	0	0	0,00	2,74	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00
Canindeyú	87	87	100	0	0	100	0	100	100	100	0,82	0,40	87	87	0	0	0	0	0,00	0,00
Pdte. Hayes	95	95	100	0	100	0	100	0	0	0	0,00	0,00	95	95	0	0	0	0	0,00	0,00
Boquerón	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00
A. Paraguay	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00
Asunción	93	93	71	0	100	0	57	0	0	0	0,00	0,00	93	93	0	0	0	0	0,00	0,00
Total, País	96	96	58	71	71	78	49	76	49	76	0,12	0,77	96	96	100	67	0	67	0,05	0,14

*Tasa mínima esperada de EFE - 5:100.000 habitantes.

Último caso registrado de Sarampión SE 37 del 2022, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

** Tasa mínima esperada de PAF - 1:100.000 < 15 años.

Último caso registrado de Poliomielitis en 1985.

En la tabla N° 2. Se presentan los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomielitis**; el porcentaje mínimo requerido es de 80% por indicador, sin embargo, en Paraguay se estableció alcanzar el 95% en cada Región Sanitaria por el riesgo de reintroducción del sarampión/ rubéola.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Entre la SE 1 al 3 el país cuenta con 1.449 unidades notificadoras; con un cumplimiento del 96%.

Se recuerda a las regiones realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos notificados en la planilla de Enfermedad de Notificación Obligatoria con el número de casos notificados por ficha epidemiológica individual.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: la tasa de notificación entre la SE N° 1 al 3 el país cumplió con dicho indicador, no así con la investigación y muestra adecuada.

La investigación adecuada realizada dentro de las 48 hs de notificado el caso sospechoso, es de suma importancia para evitar casos secundarios en la comunidad de confirmarse el caso como sarampión o rubéola. Es por eso que debe realizarse ante la sospecha, sin esperar el resultado de laboratorio.

Indicadores de Vigilancia de la PFA para Poliomielitis: Entre la SE 1 al 3 el país ha cumplido con la tasa de notificación, sin embargo, el de investigación y muestra adecuada no cumple, (Tabla N°2).

OBS: Es importante que cada Región Sanitaria realice el análisis de sus indicadores, a fin de verificar y comparar la calidad de sus datos; e identificar en forma oportuna los problemas que dificultan el cumplimiento de los mismos; y realizar intervenciones oportunas que eviten la reintroducción de enfermedades y/o la propagación.