



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1 AL 40 - 2024

REGION SANITARIA	PFA			EFE**			SRC			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS		TNN			TOE			VARICELA		ESAVI
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.
Concepción	2	2	0	15	15	0	4	4	0	13	13	15	15	3
S. Pedro N.	1	0	0	11	11	0	3	3	18	18	...
S. Pedro S.	1	1	0	12	12	0	1	1	0	5	5	17	17	2
Cordillera	3	3	0	50	49	0	1	1	0	18	18	57	57	5
Guairá	1	1	0	37	36	0	8	8	1	0	1	16	16	1
Caaguazú	29	27	0	1	1	0	7	7	1	0	1	51	51	2
Caazapá	6	5	0	1	1	0	2	2	17	17	...
Itapúa	4	3	0	91	87	0	1	1	0	15	15	0	36	36	152	152	14
Misiones	1	1	0	31	30	0	1	1	0	4	4	15	15	3
Paraguarí	1	1	0	107	107	0	1	1	0	1	1	0	22	22	110	110	4
A. Paraná	2	2	0	32	32	0	2	2	0	2	2	0	8	7	0	20	20	1	0	1	44	44	5
Central	7	6	0	275	271	0	8	6	0	2	2	0	16	16	0	179	179	1	0	1	541	541	24
Ñeembucú	84	83	0	17	17	68	68	1
Amambay	10	10	0	4	4	1	0	0	15	15	3
Canindeyú	1	1	0	13	12	0	1	1	0	1	0	1	6	6	10	10	1
Pdte. Hayes	24	24	0	5	5	0	20	20	1	0	1	61	61	12
Boquerón	4	4	0	1	1	0	4	4	9	9	2
A. Paraguayo	3	3	0	4	4	42	42	7
Asunción	1	1	0	39	37	0	1	1	0	2	2	0	28	28	151	151	31
Total, País	25	22	0	873	855	0	16	14	0	6	6	0	54	52	1	400	400	1	0	0	5	0	5	1.409	1.409	120

Notif: Casos sospechosos notificados de la SE 1 al 40 del 2024. ... No se notificó casos sospechosos

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI a la SE 40 del 2024, notificados por las Regiones Sanitarias.

Hasta la SE 40 el país **no se han confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, síndrome de rubeola congénita, poliomielitis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Parálisis Flácida Aguda (PFA) para poliomielitis en < de 15 años: hasta la SE 40 se han notificado 25 casos, de los cuales 22 fueron descartados con retorno de resultados de laboratorio negativo y tres pendientes de cierre.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: hasta la SE 40 se han notificado 873 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 855 (98%) fueron descartados por laboratorio y/o criterio clínico epidemiológico

Síndrome de Rubeola Congénita (SRC): hasta la SE 40 se notificaron 16 casos sospechosos, de los cuales 14 casos están descartados por laboratorio.

Difteria: hasta la SE 40 se han notificado seis casos sospechosos, todos descartado por Laboratorio.

Coqueluche: Hasta la SE 40 se han notificado 54 casos sospechosos, un caso confirmado del departamento de Canindeyú; 52 descartados y un caso pendiente de resultado.

Parotiditis: Hasta la SE 40 se han notificado 400 casos confirmados por clínica.

Tétanos Neonatal (TNN): Se notificó un caso sospechoso con residencia en el departamento de Amambay pendiente de cierre.

Tétanos en Otras Edades (TOE): Hasta la SE 40 se han notificado cinco casos sospechosos, todos fueron confirmados, fijan residencia en los departamentos de Caaguazú, Pte. Hayes, Guaira, Ato Paraná y Central en donde tres evolucionaron favorablemente y dos óbitos.

Varicela: hasta la SE 40 se ha notificado 1.409 casos confirmados por clínica.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): hasta la SE 40 se ha notificado 120 casos por vacunas del esquema regular. El 76% de los casos se clasifican como no grave.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2023 – 2024 SE 1 AL 40

Tasa ideal de EFE: 2 casos por 100.000 habitantes

Tasa ideal de PFA: 1 por 100.000 < de 15 años

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA										POLIOMIELITIS									
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		%Muest lileg. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa*		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa**	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Concepción	97	100	70	80	90	100	80	100	90	100	3.76	7.11	88	100	...	100	...	100	0.00	3.19
S. Pedro N	98	100	100	70	100	91	100	40	100	78	3.30	6.31	96	100	...	100	...	0	0.00	1.83
S. Pedro S	99	100	0	100	0	100	0	91	0	98	0.00	6.66	99	100	100	100	50	100	2.67	1.98
Cordillera	99	100	73	82	98	98	82	96	80	90	20.43	17.94	98	100	100	100	100	100	1.15	4.43
Guairá	100	100	80	86	100	92	100	94	100	88	2.13	20.07	99	100	100	100	100	100	1.55	2.23
Caaguazú	96	100	50	93	100	90	90	85	90	85	1.72	6.54	89	100	1.73	0.00
Caazapá	98	100	67	83	100	100	100	50	100	83	3.01	4.18	97	100	0.00	0.00
Itapúa	100	100	52	78	99	99	91	99	94	92	36.25	20.33	99	100	100	100	100	75	1.07	3.45
Misiones	97	96	77	58	88	84	57	56	100	93	19.51	26.31	100	96	...	100	...	100	0.00	3.47
Paraguarí	100	100	86	94	92	94	88	98	96	91	138.36	52.57	100	100	100	100	100	100	1.48	2.14
A. Paraná	96	98	76	88	96	97	79	55	92	87	2.89	3.98	98	98	...	100	...	100	0.00	0.93
Central	100	100	37	74	42	87	89	82	98	89	13.57	14.29	100	100	100	86	75	86	1.30	1.48
Ñeembucú	100	100	85	94	100	94	80	98	88	91	43.61	97.40	100	100	0.00	0.00
Amambay	100	100	100	100	75	100	0	80	100	100	2.23	5.71	100	100	100	...	100	...	1.88	0.00
Canindeyú	97	97	50	77	100	100	100	85	100	62	3.22	6.74	97	97	100	100	100	100	1.33	1.70
Pdte. Hayes	100	100	64	83	64	92	86	65	86	96	8.16	18.50	99	100	100	...	0	...	2.41	0.00
Boquerón	99	89	100	100	0	100	100	100	100	100	1.42	5.54	97	89	100	...	100	...	9.49	0.00
A. Paraguay	98	100	100	100	100	100	100	67	100	100	5.18	16.58	100	100	0.00	0.00
Asunción	97	100	72	97	84	95	96	100	93	86	6.14	7.91	99	100	...	100	...	100	0.00	1.00
Total, País	98	99,3	63	82	80	93	87	86	94	90	16,57	13,91	98	99,3	100	96	83	88	1,37	1,55

*Cumplimiento de tasa de EFE

Último caso registrado de Sarampión SE 37 del 2022, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

** Cumplimiento de tasa de PFA

Último caso registrado de Poliomieltis en 1985.

... No se notificó caso sospechoso

Tasa mínima esperada de EFE: 2 x 100.000 habitantes. Si la población es < de 100.000 se espera un caso.

Tasa mínima esperada de PAF: 1 x 100.000 < 15 años. Si la población es < de 100.000 se espera un caso.

En la tabla N° 2. Los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomieltis**; el porcentaje mínimo requerido es de 80%.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Entre la SE 1 al 40, el país cuenta con 1.467 unidades notificadoras; con cumplimiento del 99,3%.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: Hasta la SE 40 el país cumple con todos los indicadores de la Vigilancia.

Indicadores de Vigilancia de la PFA para Poliomieltis: Entre la SE 1 al 40 el país cumple con todos los indicadores de vigilancia.

Recordatorio

Vigilancia de la PFA: en caso de muestra inadecuada (muestra de heces recolectada posterior a los 14 días de la parálisis del caso), se debe recolectar muestra de heces a 3 o 5 contactos menores de 5 años de edad. Estos pueden ser vecinos, familiares, amigos, compañeros de juegos, etc., en la brevedad posible, la muestra se debe enviar en un frasco estéril de tapa rosca, 8 gr de heces, tamaño de 2 pulgares, sin nada de conservantes (un frasco por cada muestra), adjuntar carnet de vacunación, ficha de PFA, mencionando que es contacto del caso, con la fecha de toma de muestra y refrigerar a +2+8 °C y enviar las muestras con la ficha PFA completa al LCSP en un plazo no mayor a dos días de su recolección, avisar al PAI nacional de su envío al LCSP.

La investigación de las EPV realizada dentro de las 48 hs de notificado el caso sospechoso es de suma importancia para evitar casos secundarios.

Se recuerda a las Unidades Epidemiológica Regional realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos notificados en la planilla de Enfermedad de Notificación Obligatoria con el número de casos notificados por ficha epidemiológica individual.