



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1 AL 42 - 2024

REGION SANITARIA	PFA			EFE**			SRC			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS		TNN			TOE			VARICELA		ESAVI
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.
Concepción	3	2	0	16	15	0	4	4	0	13	13	16	16	4
S. Pedro N.	1	0	0	11	11	0	3	3	19	19	...
S. Pedro S.	1	1	0	12	12	0	1	1	0	5	5	17	17	2
Cordillera	3	3	0	50	49	0	1	1	0	18	18	57	57	5
Guairá	1	1	0	38	38	0	8	8	1	0	1	18	18	1
Caaguazú	28	27	0	1	1	0	8	8	1	0	1	53	53	2
Caazapá	7	6	0	1	1	0	5	5	17	17	...
Itapúa	4	3	0	93	91	0	1	1	0	16	16	0	39	39	165	165	14
Misiones	1	1	0	31	30	0	1	1	0	4	4	16	16	4
Paraguarí	1	1	0	108	107	0	1	1	0	1	1	0	24	24	119	119	6
A. Paraná	2	2	0	32	32	0	2	2	0	2	2	0	8	8	0	20	20	1	0	1	47	47	5
Central	8	6	0	298	278	0	8	6	0	2	2	0	16	16	0	187	187	1	0	1	570	570	27
Ñeembucú	1	0	0	87	85	0	18	18	75	75	1
Amambay	10	10	0	4	4	1	0	0	17	17	3
Canindeyú	1	1	0	16	15	0	1	1	0	1	0	1	6	6	13	13	1
Pdte. Hayes	24	24	0	5	5	0	22	22	1	0	1	61	61	12
Boquerón	4	4	0	1	1	0	4	4	9	9	2
A. Paraguayo	3	3	0	4	4	42	42	7
Asunción	1	1	0	40	38	0	1	1	0	2	2	0	28	28	156	156	32
Total, País	28	22	0	908	875	0	16	14	0	6	6	0	55	54	1	420	420	1	0	0	5	0	5	1.487	1.487	128

Notif.: Casos sospechosos notificados de la SE 1 al 42 del 2024. ... No se notificó casos sospechosos

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI a la SE 42 del 2024, notificados por las Regiones Sanitarias.

Hasta la SE 42 el país **no se han confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, síndrome de rubeola congénita, poliomielitis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Parálisis Flácida Aguda (PFA) para poliomielitis en < de 15 años: hasta la SE 42 se han notificado 28 casos, de los cuales 22 fueron descartados con retorno de resultados de laboratorio negativo y seis pendientes de cierre.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: hasta la SE 42 se han notificado 908 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 875 (96.3%) fueron descartados por laboratorio y/o criterio clínico epidemiológico

Síndrome de Rubeola Congénita (SRC): hasta la SE 42 se notificaron 16 casos sospechosos, de los cuales 14 casos están descartados por laboratorio.

Difteria: hasta la SE 42 se han notificado seis casos sospechosos, todos fueron descartados por laboratorio.

Coqueluche: Hasta la SE 42 se han notificado 55 casos sospechosos, un caso confirmado del departamento de Canindeyú; 54 descartados.

Parotiditis: Hasta la SE 42 se han notificado 420 casos confirmados por clínica.

Tétanos Neonatal (TNN): Se notificó un caso sospechoso con residencia en el departamento de Amambay pendiente de cierre.

Tétanos en Otras Edades (TOE): Hasta la SE 42 se han notificado cinco casos sospechosos, todos fueron confirmados, fijan residencia en los departamentos de Caaguazú, Pte. Hayes, Guaira, Ato Paraná y Central en donde tres evolucionaron favorablemente y dos óbitos.

Varicela: hasta la SE 42 se ha notificado 1.487 casos confirmados por clínica.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): hasta la SE 42 se ha notificado 128 casos por vacunas del esquema regular. El 76% de los casos se clasifican como no grave.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2023 – 2024 SE 1 AL 42

Tasa ideal de EFE: 2 casos por 100.000 habitantes

Tasa ideal de PFA: 1 por 100.000 < de 15 años

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA												POLIOMIELITIS							
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		%Muest lileg. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa*		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa**	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Concepción	97	98	70	75	90	100	80	93	90	100	4.13	7.11	97	98	0	100	0	100	0.00	3.19
S. Pedro N	98	100	71	70	71	91	83	40	100	78	3.30	6.31	98	100	0	100	0	0	0.00	1.83
S. Pedro S	99	100	0	100	0	100	0	91	0	98	0.00	6.66	99	100	100	100	50	100	2.67	1.98
Cordillera	99	100	74	80	99	100	81	100	81	92	21.67	17.94	99	100	100	100	100	100	1.15	4.43
Guairá	100	100	80	87	100	92	100	97	100	91	2.13	20.07	100	100	100	100	100	100	1.55	2.23
Caaguazú	96	100	50	96	100	100	90	96	90	96	1.72	7.00	96	100	100	...	100	...	1.73	0.00
Caazapá	98	100	67	71	100	100	100	85	100	100	3.01	4.18	98	100	0	...	0	...	0.00	0.00
Itapúa	100	100	51	78	99	98	91	97	94	95	36.56	20.77	100	100	100	100	100	100	1.07	3.45
Misiones	97	100	77	58	88	81	57	100	100	93	19.51	26.31	97	100	0	100	0	100	0.00	3.47
Paraguarí	100	100	86	95	92	100	88	99	96	92	141.02	52.57	100	100	100	100	100	100	1.48	2.14
A. Paraná	96	99	76	88	96	94	79	100	92	90	2.89	3.98	96	99	0	100	100	100	0.40	0.93
Central	100	84	38	75	43	87	88	96	98	94	14.00	14.40	100	84	100	89	75	89	1.30	1.90
Ñeembucú	100	100	85	89	100	95	80	100	88	98	43.61	98.56	100	100	0	100	0	100	0.00	5.95
Amambay	100	100	100	100	80	100	25	100	100	100	2.78	5.71	100	100	100	...	100	...	1.88	0.00
Canindeyú	97	98	50	81	100	100	100	100	100	75	3.63	6.74	97	98	100	100	100	100	1.33	1.70
Pdte. Hayes	100	100	64	83	64	92	86	100	86	96	8.16	18.50	100	100	100	...	0	...	2.41	0.00
Boquerón	99	100	100	100	100	100	0	100	100	100	1.42	5.54	99	100	100	...	100	...	9.49	0.00
A. Paraguay	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	5.18	16.58	98	100	0	...	0	...	0.00	0.00
Asunción	97	100	71	95	85	100	90	97	93	90	6.52	8.12	97	100	0	100	0	100	0.00	1.00
Total, País	98	95	63	82	80	94	87	98	94	93	15.79	14,03	98	95	100	96	83	93	1.14	1.73

*Cumplimiento de tasa de EFE

Último caso registrado de Sarampión SE 37 del 2022, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

** Cumplimiento de tasa de PFA

Último caso registrado de Poliomieltitis en 1985.

... No se notificó caso sospechoso

Tasa mínima esperada de EFE: 2 x 100.000 habitantes. Si la población es < de 100.000 se espera un caso.

Tasa mínima esperada de PAF: 1 x 100.000 < 15 años. Si la población es < de 100.000 se espera un caso.

En la tabla N° 2. Los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomieltitis**; el porcentaje mínimo requerido es de 80%.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Entre la SE 1 al 42, el país cuenta con 1.467 unidades notificadoras; con cumplimiento del 95%.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: Hasta la SE 42 el país cumple con todos los indicadores de la Vigilancia.

Indicadores de Vigilancia de la PFA para Poliomieltitis: Entre la SE 1 al 42 el país cumple con todos los indicadores de vigilancia.

Recordatorio

Vigilancia de la PFA: en caso de muestra inadecuada (muestra de heces recolectada posterior a los 14 días de la parálisis del caso), se debe recolectar muestra de heces a 3 o 5 contactos menores de 5 años de edad. Estos pueden ser vecinos, familiares, amigos, compañeros de juegos, etc., en la brevedad posible, la muestra se debe enviar en un frasco estéril de tapa rosca, 8 gr de heces, tamaño de 2 pulgares, sin nada de conservantes (un frasco por cada muestra), adjuntar carnet de vacunación, ficha de PFA, mencionando que es contacto del caso, con la fecha de toma de muestra y refrigerar a +2+8 °C y enviar las muestras con la ficha PFA completa al LCSP en un plazo no mayor a dos días de su recolección, avisar al PAI nacional de su envío al LCSP.

La investigación de las EPV realizada dentro de las 48 hs de notificado el caso sospechoso es de suma importancia para evitar casos secundarios.

Se recuerda a las Unidades Epidemiológica Regional realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos notificados en la planilla de Enfermedad de Notificación Obligatoria con el número de casos notificados por ficha epidemiológica individual.